

Dobenox Forte 500 mg, 60 tabletek

Cena: 68,99 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	DOBENOX
Opakowanie	60 tabletek
Postać	Tabletki powlekane
Producent	PRZEDS. PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Przeznaczenie	Przeciwobrzękowe, Uszczelniające
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Dobenox Forte to lek, który uszczelnia naczynia krwionośne i poprawia ich elastyczność. Wspomaga krążenie żyłne i jest stosowany u dorosłych w objawowym leczeniu niewydolności żyłnej nóg oraz hemoroidów.

Wskazania

Wskazaniem do zastosowania leku Dobenox Forte jest objawowe leczenie niewydolności żyłnej nóg: bóle i nocne kurcze nóg, uczucie ciężkości nóg, parestezje, obrzęk, zmiany skórne na tle zastoju krwi oraz żylaki kończyn dolnych. Stosowany jest również w terapii żylaków odbytu (hemoroidów).

Działanie

Lek Dobenox Forte wpływa zarówno na stan naczyń, jak i na parametry układu krwinkowego. Zmniejsza lepkość krwi obniżając m.in. agregację krwinek i stężenie fibrynogenu. Zwiększa również drenaż naczyń limfatycznych oraz zmniejsza ich przepuszczalność i kruchość.

Dawkowanie

Zwykle zalecana dawka dobową w leczeniu niewydolności żyłnej i żylaków odbytu dla osób dorosłych to 500 mg do 1000 mg dobesylanu wapnia, czyli 1 - 2 tabletki na dobę.

Skład

- Substancją czynną jest jednowodny dobesylan wapnia.
- 1 tabletka zawiera 500 mg wapnia dobesylanu jednowodnego.
- Substancje pomocnicze: celuloza mikrokryształiczna, skrobia ziemniaczana, laktoza jednowodna, talk, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna, otoczka Opadry II 57U18539 White (o składzie: hypromeloza, polidekstroza, tytanu dwutlenek (E 171), talk, maltodekstryna, średniołańcuchowe trójglicerydy).



Przeciwwskazania

Leku Dobenox Forte nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na substancje czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

Działania niepożądane

W przypadku leku Dobenox Forte działania niepożądane występowały rzadko (u 1 do 10 pacjentów na 10 000) i były to: nudności, biegunka, odczyny skórne, bóle stawów lub bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 pacjenta na 10 000): agranulocytoza z wysoką gorączką, bólem gardła, zmianami zapalnymi w obrębie odbytu i narządów płciowych i zakażeniami jamy ustnej.

Ostrzeżenia

- Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy, z zapaleniem błony śluzowej żołądka z niewydolnością nerek.
- W przypadku wystąpienia w czasie kuracji wysokiej gorączki, bólu gardła, zakażenia jamy ustnej i innych objawów wskazujących na zakażenie należy zaprzestać stosowania leku i zasięgnąć porady lekarskiej.
- Lek zawiera laktozę (w 1 tabletkie jest 50 mg). Nie należy stosować leku w niektórych chorobach związanych z nietolerancją cukrów.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.

Producent

HASCO-LEK
Żmigrodzka 242e
Wrocław