

Doppelherz Energovital Tonik K, płyn doustny, 1000 ml



Cena: 66,46 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	DOPPELHERZ
Opakowanie	1 l
Postać	płyn doustny
Producent	QUEISSER PHARMA GMBH & CO. KG
Przeznaczenie	Uspokajające (wyciszające), Wspomaganie pracy serca, Wzmacniające
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Płyn doustny **Doppelherz Energovital Tonik K** to preparat wspierający pracę serca i układu krążenia, szczególnie w sytuacjach napięcia nerwowego. Zawiera silne wyciągi z ziół leczniczych, takich jak owoc głogu, liść melisy, liść rozmarynu i korzeń kozłka lekarskiego (waleriany). Tonik ma postać ciemnobrązowego płynu.

Wskazania

Lek stosowany tradycyjnie jako środek wspomagający czynności serca i układu krążenia, stany napięcia nerwowego.

Działanie

Zwiększające wydolność serca, przeciwmiażdżycowe, uspokajające, tonizujące.

Dawkowanie

Dorośli: stosować doustnie po 20 ml płynu 3-4 razy na dobę, podczas posiłków i przed snem.

Skład

20 ml płynu zawiera:

- substancje czynne: wyciąg z owoców głogu (1:1) (ekstrahent: 50% m/m etanol) 400 mg, wyciąg z owoców głogu (1:2) (ekstrahent: 60% V/V etanol) 220 mg, wyciąg z liści melisy (1:1) 100 mg, wyciąg z liści rozmarynu (1:1) 100 mg, wyciąg z korzenia kozłka lekarskiego (waleriany) (1:1) 100 mg,
- substancje pomocnicze: miód, cukier inwertowany, glicerol, karmel (E 150a), wino słodkie.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować Doppelherz Energovital Tonik K:



- Jeśli pacjent ma uczulenie (lub nadwrażliwość) na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Działania niepożądane

Nie stwierdzono działań niepożądanych podczas stosowania leku Doppelherz Energovital Tonik K. Nie można wykluczyć objawów uczulenia (nadwrażliwości) na niektóre składniki leku. Korzeń kozłka lekarskiego może niekiedy wywoływać łagodne objawy niepożądane ze strony przewodu pokarmowego (mdłości, kolkę jelitową).

Ostrzeżenia

- W przypadku pojawienia się bólu w rejonie serca, promieniującego do ramion, szyi lub nadbrzusza albo w razie pojawienia się zaburzeń oddychania należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza.
- Nie zaleca się stosowania u osób z chorobami wątroby, chorobą alkoholową, padaczką, u osób z uszkodzeniami mózgu, kobiet w ciąży oraz dzieci.
- Lek zawiera 17% obj. alkoholu. Dawka leku (20 ml) zawiera 2,8 g alkoholu, co odpowiada 70 ml piwa (5% obj.) lub 30 ml wina (12 % obj.)
- Dawka dobową (60–80 ml) odpowiada 1–1,4 ww (wymienników węglowodanowych). W przypadku stwierdzonej nietolerancji na jakiegokolwiek cukry, przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Producent

QUEISSER
Schleswiger Str. 74
Flensburg