

DoppelSil, 25 mg, tabletki do rozgryzania i żucia, 4 tabletki

Cena: 20,21 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla mężczyzn
Opakowanie	4 tabletki
Postać	Tabletki
Producent	DOPPELHERZ PHARMA GMBH
Przeznaczenie	Wspomagające
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych

Opis produktu

Opis

DoppelSil w formie tabletek do rozgryzania i żucia to lek dedykowany dorosłym mężczyznom z problemami erekcyjnymi. Zawiera sildenafil – substancję czynną, która wspomaga przepływ krwi do prącia w trakcie stymulacji seksualnej. Dzięki wygodnej formie podania, nie ma potrzeby popijania – wystarczy rozgryźć tabletkę i połknąć.

Wskazania

Lek DoppelSil jest stosowany u dorosłych mężczyzn (w wieku powyżej 18 lat) w leczeniu zaburzeń wzwodu, czyli impotencji definiowanej jako niemożność uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Leku nie należy przyjmować, jeśli nie występują zaburzenia erekcji.

Działanie

Działanie DoppelSilu związane jest z rozkurczającym działaniem sildenafilu na naczynia krwionośne prącia. Substancja czynna leku hamuje enzym fosfodiesterazę typu 5 i ułatwia napływ krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego. DoppelSil pomaga osiągnąć wzwód jedynie pod warunkiem uprzedniego pobudzenia seksualnego.

Dawkowanie

Lek podaje się doustnie, tabletkę należy żuć w całości a następnie połknąć. Zwykle stosowane dawkowanie DoppelSilu to 1 tabletki na ok. 30 do 60 minut przed planowaną aktywnością seksualną. Maksymalna dawka dobową leku to 1 tabletki.

Skład

- Substancją czynną leku jest sildenafil.
- 1 tabletki do rozgryzania i żucia zawiera 25 mg sildenafilu (w postaci sildenafilu cytrynianu).
- Substancje pomocnicze: polakrylina potasowa, krzemionka koloidalna bezwodna, laktoza jednowodna, powidon K-30, aspartam (E951), kroscarmeloza sodowa, aromat miętowy, magnezu stearynian, potasu wodorotlenek (do ustalenia pH) lub kwas solny, stężony (do ustalenia pH).

Przeciwwskazania

Nie stosować DoppelSilu u pacjentów z uczuleniem na sildenafil lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Przeciwwskazaniem do zastosowania leku są ciężkie choroby serca lub wątroby, niskie ciśnienie tętnicze krwi oraz niedawno przebyty udar czy zawał serca. Nie podawać leku u osób z dziedzicznymi zmianami degeneracyjnymi siatkówki, takimi jak zwyrodnienie barwnikowe siatkówki (retinitis pigmentosa), oraz u których stwierdzono kiedykolwiek utratę wzroku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego.

Działania niepożądane

- Bardzo często występujące działania niepożądane (u więcej niż 1 na 10 pacjentów): ból głowy.
- Często występujące działania niepożądane (u 1 na 10 pacjentów): nudności, nagłe zaczerwienienie twarzy, uderzenia gorąca (objawy obejmują uczucie gorąca w górnej części ciała), niestrawność, widzenie z kolorową poświatą, niewyraźne widzenie, zaburzenia widzenia, uczucie zatkanego nosa, zawroty głowy.
- Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 na 100 pacjentów): wymioty, wysypka skórna, podrażnienie oka, przekrwienie oczu, ból oczu, widzenie błysków światła, jaskrawe widzenie, wrażliwość na światło, łzawienie oczu, kołatanie serca, szybkie bicie serca, nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie, bóle mięśni, senność, osłabione czucie dotyku, zawroty głowy, dzwonienie w uszach, suchość w jamie ustnej, zatkanie lub niedrożne zatoki, zapalenie błony śluzowej nosa (objawy obejmują katar, kichanie i zatkały nos), ból w górnej części brzucha, choroba refluksowa przełyku (objawy obejmują zgagę), krew w moczu, ból rąk lub nóg, krwawienie z nosa, uczucie gorąca oraz uczucie zmęczenia.
- Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 na 1000 pacjentów): omdlenia, udar, zawał serca, nieregularne bicie serca, przemijające zmniejszenie przepływu krwi do części mózgu, uczucie ucisku w gardle, zdrętwienie ust, krwawienie do tylnej części oka, podwójne widzenie, zmniejszona ostrość widzenia, nieprawidłowe odczucia we wnętrzu oka, obrzęk oczu lub powiek, niewielkie cząstki lub punkty w polu widzenia, widzenie obwódek wokół źródeł światła, rozszerzenie źrenicy, nieprawidłowe zabarwienie białkówki oka, krwawienie z prącia, obecność krwi w spermie, suchość nosa, obrzęk wewnątrz nosa, uczucie drażliwości oraz nagłe osłabienie lub utrata słuchu.

Ostrzeżenia

- Przed zastosowaniem produktu leczniczego należy skonsultować się z lekarzem w przypadku: występowania kiedykolwiek ponad 4-godzinnej erekcji, nawet bez podniecenia seksualnego; anatomicznego zniekształcenia prącia lub choroby Peyroniego; dolegliwości ze strony serca, choroby wrzodowej; zaburzeń krzepnięcia.
- Nie przyjmować leku, jeśli nie zdiagnozowana zaburzeń erekcji.
- DoppelSil nie jest przeznaczony dla kobiet.
- Produkt leczniczy zawiera aspartam (źródło fenyloalaniny) oraz laktozę, więc mężczyźni z fenyloketonurią czy nietolerancją niektórych cukrów przed zastosowaniem DoppelStilu powinni skonsultować się z lekarzem.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Producent

DOPPELHERZ PHARMA GMBH
Schleswiger Strasse 74
24941 Flensburg, Niemcy