

# Dulcobis, 5 mg, tabletki dojelitowe, 40 tabletek



Cena: 15,23 zł

## Opis słownikowy

|                 |                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| Dla kogo        | Dla kobiet, Dla mężczyzn                                |
| Opakowanie      | 40 tabletek                                             |
| Postać          | Tabletki                                                |
| Producent       | INPHARM SP. Z O.O.                                      |
| Przeznaczenie   | Przeczyszczające                                        |
| Rodzaj produktu | Lek bez recepty                                         |
| Wiek            | Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów |

## Opis produktu

### Opis

**Dulcobis** to lek o właściwościach przeczyszczających, który wspomaga proces wypróżniania oraz ułatwia oddawanie stolca poprzez jego zmiękczenie.

### Wskazania

Lek Dulcobis stosuje się w krótkotrwałym, objawowym leczeniu zaparć:

- u pacjentów cierpiących na zaparcia,
- w celu przygotowania do badań, przed operacjami i po operacjach oraz w stanach wymagających ułatwienia wypróżnienia.

### Działanie

Dulcobis to miejscowo działający lek przeczyszczający powodujący pobudzenie wypróżnienia i rozmiękczenie stolca.

### Dawkowanie

- Dorośli: doustnie 1-2 tabletki dojelitowe przed snem.
- Młodzież i dzieci powyżej 10 lat: doustnie 1-2 tabletki dojelitowe przed snem.

Zaleca się rozpoczęcie leczenia od najmniejszej dawki. Dawkę można dostosować do najwyższej zalecanej dawki w celu uzyskania regularnych wypróżnień. Nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej (2 tabletki).

- Dzieci 4-10 lat: doustnie 1 tabletkę dojelitową przed snem. Nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej (1 tabletki). Dzieci w wieku 10 lat i młodsze z przewlekłymi lub uporczywymi zaparciami powinny być leczone wyłącznie pod opieką lekarza.

### Skład

- Substancją czynną leku jest bisakodyl (Bisacodylum)

- 1 tabletkę dojelitową zawiera 5 mg bisakodylu.
- Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, skrobia kukurydziana rozpuszczalna, glicerol 85%, magnezu stearynian, otoczka: magnezu stearynian, sacharoza, talk, guma arabska, tytanu dwutlenek (E171), kwasu metakrylowego i metylu metakrylanu kopolimer (1:1), kwasu metakrylowego i metylu metakrylanu kopolimer (1:2), olej rycynowy, makrogol 6000, żelaza tlenek żółty (E172), wosk biały, wosk Carnauba, szelak.

### Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Dulcobis:

- jeśli pacjent ma nadwrażliwość na bisakodyl lub którykolwiek z pozostałych składników leku,
- jeśli pacjent cierpi na niedrożność jelit,
- jeśli pacjent cierpi na ostre stany chorobowe w jamie brzusznej, w tym na zapalenie wyrostka robaczkowego czy ostre zapalne choroby jelit,
- jeśli organizm pacjenta utracił dużo wody,
- jeśli pacjent odczuwa silny ból brzucha połączony z nudnościami i wymiotami - może to wskazywać na poważniejsze schorzenia,
- jeśli u pacjenta występuje dziedziczna nietolerancja niektórych cukrów.

### Działania niepożądane

Często (występują rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów, ale częściej niż u 1 na 100 pacjentów):

- skurcze w obrębie jamy brzusznej, ból w jamie brzusznej, biegunka, nudności

Niezbyt często (występują rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów, ale częściej niż u 1 na 1000 pacjentów):

- uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej, wymioty, krew w kale, uczucie dyskomfortu w okolicach odbytu, zawroty głowy

Rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów, ale częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

- reakcje nadwrażliwości, omdlenia, odwodnienie, obrzęk naczynioruchowy, szybko postępujące, zagrażające życiu reakcje anafilaktyczne, zapalenie okrężnicy w tym niedokrwienne zapalenie jelita grubego

### Ostrzeżenia

- Lek zawiera 33,2 mg laktozy oraz 23,4 mg sacharozy w jednej tabletkę dojelitowej.
- Lek nie powinien być przyjmowany wraz ze środkami zmniejszającymi zakwaszenie żołądka (mleko, leki zobojętniające sok żołądkowy lub inhibitory pompy protonowej).
- Nie należy stosować codziennie przez długi okres bez zbadania przyczyny zaparc.
- Lek przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

### Producent

Opella Healthcare Poland Sp. z o.o.  
ul. Marcina Kasprzaka 6  
01-211 Warszawa