

# Duozinal Lek przeciwalergiczny 150 ml



Cena: 17,55 zł

## Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	150 ml
Postać	Syrop
Producent	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwalergiczne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 2 lat

## Opis produktu

### Opis

**Syrop Duozinal** to preparat przeciwalergiczny, którego skład obejmuje dichlorowodorek cetyryzyny, chlorek wapnia. Stosuje się go w leczeniu objawów uczulenia, takich jak świąd nosa, przekrwienie błony śluzowej nosa, zaczerwienienie i swędzenie oczu, łzawienie, zaczerwienienie skóry czy pokrzywka. Preparat jest przeznaczony zarówno dla dorosłych, jak i dzieci w wieku od 2 lat i starszych.

### Wskazania

Dla dorosłych i dzieci w wieku 2 lat i powyżej w celu łagodzenia objawów dotyczących nosa i oczu, związanych z sezonowym i przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (takich jak kichanie, świąd nosa, przekrwienie błony śluzowej nosa, zaczerwienienie i swędzenie oczu, łzawienie); łagodzenia objawów przewlekłej idiopatycznej pokrzywki (takich jak świąd, pokrzywka, zaczerwienienie skóry).

### Działanie

Przeciwalergiczne.

### Dawkowanie

- dzieci w wieku od 2. lat do 6. lat: 5ml syropu 2 razy na dobę,
- dzieci w wieku od 6. lat do 12. lat: 10ml syropu 2 razy na dobę,
- dorośli i młodzież w wieku powyżej 12. lat: 20ml syropu raz na dobę.

### Skład

5ml syropu zawiera substancje aktywne: 2,5mg cetyryzyny dichlorowodoru oraz 58mg jonów wapnia w postaci wapnia chlorku dwuwodnego; substancje pomocnicze: sacharoza, potasu sorbibian, aromat waniliowy AR 0345 (diacetyl, etylu maślan, wanilina, glikol, 1,2-propylenowy, woda), sukraloza, woda oczyszczona.

### Przeciwwskazania

Nie stosować Duozinalu u osób z nadwrażliwością na dichlorowodorek cetyryzyny, chlorek wapnia lub hydroksyzynę czy pochodne

piperazyny albo którykolwiek z pozostałych składników leku. Przeciwwskazaniami do zastosowania są: hpiekklcemia, hiperkalcuria, galaktozemia, kamica nerkowa, umiarkowane albo ciężkie zaburzenia czynności nerek, blok przedsionkowo-komorowy.

#### Działania niepożądane

Często: senność, zmęczenie; zawroty głowy, ból głowy; suchość w jamie ustnej, nudności, biegunka; zapalenie gardła, zapalenie błony śluzowej nosa (obrzęk i podrażnienie wewnątrz nosa).

Niezbyt często: pobudzenie; parestezja (zaburzenia czucia, np. uczucie mrowienia, drętwienia lub zmiany temperatury skóry); ból brzucha; świąd, wysypka (swędzące, czerwone grudki na skórze); osłabienie, złe samopoczucie.

#### Ostrzeżenia

- Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem w przypadku pacjentów z: padaczką lub skłonnościami do drgawek oraz problemami z oddawaniem moczu.
- Podczas leczenia Duzinalem nie można spożywać alkoholu.
- Duzinal zawiera sacharozę oraz glikol propylenowy. Pacjenci z cukrzycą powinni uwzględnić, że 5 ml syropu zawiera 2,852 g sacharozy. Pacjenci z nietolerancją niektórych cukrów przed zastosowaniem leku powinni skonsultować się z lekarzem. 5 ml syropu zawiera 11,31 mg glikolu propylenowego.
- Okres ważności od otwarcia butelki to 3 miesiące.
- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
- Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

#### Producent

AFLOFARM  
Partyzancka 133/151  
Pabianice

#### Galeria

