

Duphalac, 667 mg/ml, roztwór doustny, 300 ml



Cena: 35,91 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	DUPHALAC
Opakowanie	300 ml (but.)
Postać	Syrop
Producent	MYLAN HEALTHCARE SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Zaparcia
Rodzaj produktu	Produkt leczniczy
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla niemowlaka, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Roztwór doustny Duphalac to lek przeczyszczający, który zawiera laktulozę. Laktuloza działa poprzez zmiękczenie stolca i ułatwia jego przemieszczanie się poprzez zwiększenie zawartości wody w jelicie. Ważne jest to, że lek nie jest wchłaniany przez organizm. Duphalac jest stosowany w leczeniu zaparcia oraz encefalopatii wątrobowej.

Wskazania

Duphalac stosowany jest w leczeniu zaparcia (spowolnione ruchy jelit, twarde i suche stolce) oraz w celu zmiękczenia stolca np.: jeśli występują hemoroidy (żyłaki odbytu) lub po operacjach w okolicach odbytu lub w obrębie jelita grubego. Stosowany jest również w leczeniu encefalopatii wątrobowej (choroba wątroby powodująca splątanie, drżenie, obniżony poziom świadomości, w tym śpiączkę).

Działanie

Zmiękcza stolec i ułatwia jego przemieszczanie powodując przenikanie wody do jelita. Nie jest wchłaniana do organizmu.

Dawkowanie

- Dorośli i młodzież 15-45 ml.
- Dzieci (7-14 lat) 15 ml,
- Dzieci (1-6 lat) 5-10 ml,
- Niemowlęta poniżej 1 roku do 5 ml.

Skład

1 ml leku zawiera 667 mg laktulozy. Pozostałe składniki to: woda oczyszczona. Lek może zawierać bardzo małe ilości innych cukrów takich jak laktoza, galaktoza, epilaktoza i fruktoza.

Przeciwwskazania

Kiedy nie przyjmować leku Duphalac

- Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na laktulozę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Duphalac.
- Jeśli u pacjenta występuje: galaktozemia (ciężka choroba genetyczna uniemożliwiająca trawienie galaktozy), niedrożność przewodu pokarmowego (oprócz normalnego zaparcia), perforacja lub ryzyko perforacji przewodu pokarmowego.

Ostrzeżenia

- U pacjentów z cukrzycą i jednocześnie leczonych z powodu encefalopatii wątrobowej dawka leku Duphalac będzie większa. Ta duża dawka może zawierać dużą ilość cukru. Z tego powodu może być konieczne dostosowanie dawki leków przeciwcukrzycowych.
- Przewlekłe przyjmowanie niedostosowanych dawek (pojawienie się powyżej 2-3 miękkich stolców na dobę) lub nadużywanie może prowadzić do biegunki i zaburzeń elektrolitowych.
- Duphalac może zawierać cukry, np. cukier mleczny (laktoza), galaktozę lub fruktozę. Jeśli pacjent został poinformowany przez lekarza, że stwierdzono u niego nietolerancję niektórych cukrów należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Producent

ABBOTT HEALTHCARE PRODUCTS B.V.