

Duspatalin Gastro 135 mg, 15 tabletek

Cena: 21,46 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	15 tabletek
Postać	Tabletka
Producent	MYLAN HEALTHCARE SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Rozkurczowe
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Duspatalin Gastro to dostępny bez recepty lek rozkurczowy, klasyfikowany jako spazmolityk, który działa w jelitach. Jelito jest częścią przewodu pokarmowego, gdzie przemieszcza się pokarm, a jego ściany zbudowane są z mięśni, których intensywne skurcze mogą powodować ból. Duspatalin Gastro zawiera chlorowoderek mebeweryny, który rozluźnia mięśnie gładkie jelita, eliminując ból. Lek przeznaczony jest dla dorosłych oraz dzieci powyżej 10. roku życia. Stosuje się go w leczeniu bólu brzucha lub dyskomfortu w jamie brzusznej, takich jak wzdęcia, którym mogą towarzyszyć zmiany konsystencji stolca (biegunka i/lub zaparcie) lub zaburzenia wypróżnień spowodowane nieprawidłową pracą przewodu pokarmowego.

Wskazania

Dla dorosłych i dzieci powyżej 10. lat w celu leczenia objawów bólu brzucha lub dyskomfortu (np. wzdęcia, uczucie rozpierania) w jamie brzusznej, którym mogą towarzyszyć zaburzenia rytmu wypróżnień i zmiany konsystencji stolca, w tym biegunka i/lub zaparcie, spowodowanych nieprawidłową pracą przewodu pokarmowego.

Działanie

Rozkurczowe na mięśnie i przeciwbólowe.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci powyżej 10 lat: zazwyczaj stosowana dawka to 1 tabletka 135 mg 3 razy dziennie.

Skład

1 tabletka zawiera:

- substancję czynną: chlorowoderek mebeweryny 135 mg,
- substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, skrobia (kukurydziana lub ziemniaczana), powidon (K25), talk, magnezu stearynian. Otoczek: talk, sacharoza, żelatyna, guma arabska, wosk Carnauba.

Przeciwwskazania



- Uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku.
- Wiek poniżej 10 lat.
- Okres ciąży lub laktacji.

Ostrzeżenia

- Przed zastosowaniem leku należy poinformować lekarza, jeśli: pacjent jest w wieku powyżej 40 lat, u kogoś z rodziny pacjenta zdiagnozowano nowotwór okrężnicy/jelita grubego, celiakię lub chorobę zapalną jelita grubego, bóle brzucha występują w nocy, w kale występuje krew, pacjent ma nudności albo wymiotuje, chory stracił apetyt lub szybko i nieoczekiwanie schudł, pacjent ma objawy anemii, pacjent ma: ciężkie zaparcie, gorączkę, trudności albo ból podczas oddawania moczu. Przed rozpoczęciem stosowania leku należy omówić to z lekarzem, gdy pacjent odbył podróż za granicę czy u pacjentki pojawiły się nieprawidłowe krwawienia z pochwy albo upławy.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 30°C.

Producent

Mylan Healthcare Sp. z o.o.
Postępu 21B
02-676 Warszawa