

DX2LEK, 20 mg/ml, płyn na skórę, 60 ml

Cena: 33,59 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	60 ml
Postać	Płyn
Producent	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Łysienie, Wypadanie włosów
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

DX2LEK to płyn leczniczy przeznaczony do terapii łysienia androgenowego u mężczyzn. Zawiera minoksydyl – substancję aktywną, która stymuluje wzrost włosów u osób w wieku od 18 do 65 lat, zarówno u mężczyzn, jak i kobiet. Regularne stosowanie preparatu pomaga zahamować nadmierne wypadanie włosów, a z czasem wspiera ich ponowny wzrost.

Wskazania

DX2LEK stosuje się w leczeniu łysienia typu męskiego (alopecia androgenetica) u mężczyzn oraz kobiet w wieku 18–65 lat. Największą skuteczność leku występuje u młodych osób we wczesnych fazach choroby, szczególnie w okolicach szczytu głowy w porównaniu z czołem i skroniami.

Działanie

Działanie DX2LEK polega na pobudzeniu wzrostu włosów przy łysieniu typu męskiego. Początkowo zawarty w płynie na skórę minoksydyl, ogranicza nadmierne wypadanie włosów, a po dłuższym stosowaniu zauważalne są odrosty, początkowo jako cienkie włosy męszkowe.

Dawkowanie

Lek należy stosować wyłącznie zewnętrznie, na na skórę głowy. Po 8 tygodniach można zaobserwować mniejsze wypadanie włosów, a po 4–5 miesiącach odrosty. Jeśli po upływie 60 dni nie nastąpiła poprawa lub zwiększone wypadanie włosów utrzymuje się przez ponad 2 tygodnie, lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza. Należy zaprzestać leczenia po roku, jeżeli nie ma widocznych rezultatów kuracji. Zwykle stosowane dawkowanie DX2LEK to 1 ml płynu (5 naciśnieć pompki) na suchą skórę głowy 2 razy dziennie, najlepiej co 12 godzin. Lek należy nanosić za pomocą pompki na miejsca, gdzie wypadają włosy, następnie lekko rozetrzeć płyn opuszkami palców. Po zastosowaniu leku nie należy trzeć ani suszyć skóry, gdzie był on aplikowany. Należy zachować 4-godzinną przerwę między zastosowaniem leku a myciem głowy i włosów. Po zastosowaniu leku należy umyć ręce.

Skład

- Substancją czynną leku jest minoksydyl.
- 1 ml płynu zawiera 20 mg minoksydylu.

- Substancje pomocnicze: etanol, glikol propylenowy, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Nie stosować DX2LEKu u osób z nadwrażliwością na minoksydyl lub którykolwiek z pozostałych składników. Przeciwwskazaniem do zastosowania leku jest: choroba skóry głowy, nadciśnienie tętnicze, poparzoną skórę głowy, świeżo ogolona skóra głowy, opatrunek okluzyjny, stosowanie innych leków na owłosioną skórę głowy.

Działania niepożądane

- Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 osób na 100): bóle głowy; nadmierne owłosienie występujące poza miejscem aplikacji (podania leku); świąd w tym także z wysypką, świąd w innych częściach ciała, świąd oczu.
- Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 osób na 1 000): zmniejszone ciśnienie krwi; duszność; przemijające wypadanie włosów; zmiany koloru i struktury włosów; podrażnienie w miejscu podania; łuszczenie się skóry; wysypka; wysypka przypominająca trądzik; zapalenie skóry; suchość skóry, w tym w miejscu aplikacji; obrzęki obwodowe; rumień w miejscu aplikacji.
- Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 osób na 10 000): kołatanie serca; przyspieszone tętno; ból w klatce piersiowej.

Ostrzeżenia

- Lek przenika przez skórę do krwi w bardzo małej ilości, niemniej istnieje ryzyko przeniknięcia do organizmu większej dawki leku (np. w przypadku zastosowania leku na uszkodzony naskórek lub niewłaściwego użycia) i ewentualnego wystąpienia ogólnych działań niepożądanych.
- W przypadku wystąpienia i utrzymywania się jednego z takich objawów, jak niedociśnienie tętnicze, obrzęki twarzy lub kostek u nóg i rąk, kołatanie serca lub przyspieszona czynność serca, szybki przyrost masy ciała, osłabienie i zawroty głowy lub omdlenia, zaburzenia ostrości widzenia, bóle w klatce piersiowej, barku lub ramieniu, utrzymujące się zaczerwienienie, należy przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem.
- Przed zastosowaniem leku należy się skonsultować z lekarzem w przypadku pacjentów z chorobami układu krążenia lub arytmia.
- Niektóre osoby odnotowują zwiększone wypadanie włosów po upływie 2 do 6 tygodni po rozpoczęciu kuracji. Jeśli zwiększone wypadanie włosów utrzymuje się przez ponad 2 tygodnie, pacjent powinien przerwać leczenie i skontaktować się z lekarzem.
- Możliwe jest wystąpienie zmiany koloru i/lub struktury włosów.
- DX2LEK posiada w 1 ml płynu na skórę 0,15 ml glikolu propylenowego, mogącego wywoływać podrażnienia skóry.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
- Przechowywać w opakowaniu zamkniętym, z dala od źródeł ognia. Chronić od światła.
- Lek jest łatwopalny.

Producent

AFLOFARM
Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice