

Dynexan, 20 mg/ g , żel do stosowania w jamie ustnej, 10 g

Cena: 14,67 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	10 g
Postać	Żel
Producent	CHEMISCHE FABRIK KREUSSLER CO.GMBH
Przeznaczenie	Znieczulające
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka

Opis produktu

Opis

Dynexan to lek w formie żelu przeznaczony do aplikacji w jamie ustnej, którego substancją aktywną jest chlorowodorek lidokainy – składnik wykorzystywany do miejscowego znieczulania skóry oraz błon śluzowych.

Wskazania

Lek Dynexan jest stosowany do krótkotrwałego, objawowego leczenia bólu błony śluzowej jamy ustnej, dziąseł i warg u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 6 lat.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież

- Zalecana dawka dla dorosłych i młodzieży to ilość żelu wielkości groszku (ok. 0,2 g żelu (chlorowodorek lidokainy 4 mg)) stosowana 4 do 8 razy na dobę.

Dzieci

- U dzieci w wieku od 6 lat należy stosować do 4 razy na dobę ilość żelu wielkości groszku (około 0,2 g żelu (chlorowodorek lidokainy 4 mg)).

Skład

1 g żelu zawiera:

- 20 mg substancji czynnej lidokainy chlorowodorku (jako lidokainy chlorowodorek 1 H₂O)
- substancje pomocnicze: benzalkoniowy chlorek, glicerol, woda oczyszczona, tytanu dwutlenek (E 171), parafina ciekła, wazelina biała, krzemionka koloidalna bezwodna, tymol, sodowa sacharyna, guaru galaktomannan, olejek eteryczny kopru włoskiego (odmiany gorzkiej), olejek eteryczny anyżu gwiazdzistego, olejek eteryczny mięty polnej z obniżoną zawartością mentolu, olejek eteryczny miętowy.



Przeciwwskazania

Nie stosować leku Dynexan:

- jeśli pacjent ma uczulenie na lidokainy chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- jeśli pacjent jest uczulony na środki miejscowo znieczulające z grupy amidów (np. prylokaina, mepiwakaina).

Uwagi

- Lek Dynexan zawiera chlorek benzalkoniowy.
- Lek podrażnia, może powodować reakcje skórne.

Producent

CHEMISCHE FABRIK