

Dynid Gem 5 mg, 10 tabletek

Cena: 14,42 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	DYMID GEM
Opakowanie	10 tabletek
Postać	Tabletka
Producent	GLENMARK PHARMACEUTICALS S.R.O.
Przeznaczenie	Przeciwalergiczne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 12 lat

Opis produktu

Opis

Dynid Gem 5 mg to lek przeciwhistaminowy, który zawiera desloratadynę. Ma on na celu łagodzenie objawów alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i pokrzywki. Jest to lek zaliczany do drugiej generacji, co oznacza, że nie przenika do ośrodkowego układu nerwowego, co eliminuje ryzyko wywoływania senności i działania uspokajającego. Przeznaczony jest do stosowania od 12. roku życia.

Wskazania

Lek Dynid Gem 5 mg stosuje się w łagodzeniu objawów:

- alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (katar sienny),
- pokrzywki alergicznej.

Działanie

Przeciwalergiczne.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież powyżej 12. roku życia: 1 tabletka raz na dobę.

Skład

1 tabletka zawiera:

- substancję czynną: desloratadynę (Desloratadinum) 5 mg,
- substancję pomocniczą: laktoza 93,86 mg.

Przeciwwskazania

Nie stosować tabletek Dynid Gem w przypadku uczulenia na desloratadynę lub loratadynę albo którykolwiek z pozostałych składników.

Działania niepożądane

Dorośli:

- Często występujące działania niepożądane: zmęczenie; suchość w jamie ustnej; ból głowy.
- Bardzo rzadko występujące działania niepożądane : ciężkie reakcje alergiczne; wysypka; kołatanie oraz nieregularne bicie serca; szybkie bicie serca; bóle brzucha; nudności; wymioty; rozstrój żołądka; biegunka; zawroty głowy; senność; bezsenność; bóle mięśni; omamy; drgawki; niepokój z nadmierną; zapalenie wątroby
- Częstość nieznana: nietypowe osłabienie; zażółcenie skóry i (lub) gałek ocznych; zwiększona wrażliwość skóry na słońce, nawet w przypadku zachmurzenia słońca i na promieniowanie UV (ultrafioletowe), na przykład na solarium; zmiany w sposobie bicia serca; nietypowe zachowanie; zachowanie agresywne; zwiększenie masy ciała, zwiększony apetyt.

Dzieci:

Częstość nieznana: wolne bicie serca; zmiana w sposobie bicia serca; nietypowe zachowanie; zachowanie agresywne

Ostrzeżenia

- W przypadku pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub drgawkami w wywiadzie rodzinnym czy medycznym, przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
- Lek zawiera laktozę, dlatego jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem Dynidu Gin.
- Lek przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

GLENMARK PHARMACEUTICALS S.R.O.
Fibichova 143
Vysoké Mýto, Czechy

Galeria

