

Ectifem, globulki dopochwowe, 10 sztuk



Cena: 38,67 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet
Opakowanie	10 globulek
Postać	Globulka
Producent	SOLINEA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Łagodzące (kojące), Nawilżające, Ochronne, Regenerujące (odbudowujące)
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Ectifem to globulki dopochwowe opracowane z myślą o kobietach, wspomagające leczenie stanów zapalnych i regenerację błony śluzowej pochwy. Łagodzą uczucie suchości, świąd, pieczenie oraz napięcie, co może również poprawić komfort podczas stosunków. Są odpowiednie dla kobiet w każdym wieku, w tym zmagających się z hormonalnymi zmianami, także w okresie menopauzy. Globulki wspierają nawilżenie i regenerację błony śluzowej pochwy oraz mogą łagodzić objawy wynikające z radio- i chemioterapii oraz stosowania leków.

Składniki

Ektoina (Ectoin), kwas hialuronowy, Witepsol S58.

Zastosowanie

Dla kobiet w każdym wieku w celu:

- łagodzenia suchości pochwy i dyskomfortu związanego z pieczeniem, świądem i napięciem;
- przywrócenia prawidłowego poziomu nawilżenia błony śluzowej pochwy w stanach związanych ze zmianami hormonalnymi we wszystkich okresach życia (również w trakcie menopauzy);
- wspomagania regeneracji błony śluzowej pochwy i łagodzenia objawów spowodowanych przyjmowaniem leków oraz będących następstwem chemio- i radioterapii;
- łagodzenia bólu odczuwanego podczas współżycia.

Sposób użycia

Kuracja wstępna

- Stosować 1 globulkę dopochwową dziennie przez 7 dni lub zgodnie z zaleceniem lekarza.
- Globulkę najlepiej aplikować tuż przed snem.

Kuracja podtrzymująca

- Stosować 1 globulkę dopochwową 2-3 razy w tygodniu lub według wskazań lekarza.

Przeciwwskazania

Globulek dopochwowych Ectifem nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.

Ostrzeżenia

- Przed użyciem zapoznaj się z treścią instrukcji używania i etykietą bądź skonsultuj się z lekarzem, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.
- Ectifem nie chroni przed chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Ważne wskazówki

- Nie stosować podczas menstruacji oraz na uszkodzoną błonę śluzową pochwy.
- Nie stosować preparatu jednocześnie z innymi preparatami dopochwowymi bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.
- W razie stwierdzenia jakichkolwiek dolegliwości należy zaprzestać stosowania.
- Kobiety w okresie ciąży i laktacji przed użyciem powinny poradzić się lekarza.
- Nie połykać.
- Nie stosować, jeśli opakowanie zostało wcześniej otwarte lub uszkodzone.
- Nie używać po upływie terminu ważności. Data ważności dotyczy produktu prawidłowo przechowywanego.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Producent

Solinea Sp. z o.o. Sp. K.
Elizówka 65
21-003 Ciecierzyn