

Efferalgan 80 mg, 10 czopków



Cena: 16,24 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	EFFERALGAN
Opakowanie	10 czopków
Postać	Czopek
Producent	UPSA SAS
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwgorączkowe
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Efferalgan to lek w postaci czopków doodbytniczych o właściwościach przeciwbólowych i przeciwgorączkowych, przeznaczony do stosowania u dzieci, młodzieży i dorosłych w przypadku gorączki o różnym pochodzeniu oraz łagodnych do umiarkowanych bólach. Głównym składnikiem aktywnym preparatu jest paracetamol. Jedno opakowanie Efferalgan 80 mg zawiera 10 czopków.

Wskazania

- gorączka,
- bóle różnego pochodzenia,
- leczenie objawowe stanów grypopodobnych i przeziębienia.

Działanie

Przeciwbólowe, przeciwgorączkowe.

Dawkowanie

Dzieci o masie ciała od 10 do 15 kg: doodbytniczo, jednorazowo 1 czopek. W razie konieczności dawkę można powtarzać, nie częściej niż co 6 godzin. Nie należy stosować więcej niż 4 czopki na dobę.

Skład

1 czopek zawiera:

- substancja czynna: 80 mg paracetamolu,
- substancja pomocnicza: tłuszcz stały z dodatkami, w tym lecytyna pochodząca z oleju sojowego.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Efferalgan:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub chlorowoderek propacetamolu, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku, jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby lub czynna nieskutecznie leczona choroba wątroby,
- jeśli u pacjenta występuje niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej,
- jeśli pacjent jest leczony inhibitorami MAO oraz w okresie do 14 dni po zakończeniu leczenia,
- w przypadku jednoczesnego stosowania z lekami przeciwbólowymi o działaniu agonistyczno-antagonistycznym: buprenorfiną, nalbufiną, pentazocyną,
- u pacjenta po przebytych ostatnio zapaleniu odbytu, odbytnicy lub krwawieniu z odbytu.

Działania niepożądane

- Rzadko: złe samopoczucie, obniżenie ciśnienia krwi, zwiększona aktywność aminotransferaz wątrobowych.
- Bardzo rzadko: reakcje nadwrażliwości, częstoskurcz, biegunka, bóle brzucha, nudności, wymioty, kolka nerkowa, martwica brodawek nerkowych, ostra niewydolność nerek, trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi), leukopenia (zmniejszenie liczby białych krwinek), neutropenia (zmniejszenie liczby neutrofilów – typu białych krwinek), spadek wartości INR (współczynnik krzepliwości krwi), wzrost wartości INR.

Ostrzeżenia

- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.
- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Ten produkt leczniczy zawiera paracetamol. Aby uniknąć ryzyka przedawkowania, należy sprawdzić, czy inne produkty lecznicze (w tym wydawane na receptę i bez recepty) przyjmowane przez pacjenta, nie zawierają paracetamolu.
- Istnieje ryzyko miejscowego podrażnienia w miejscu podania, które wzrasta wraz z czasem leczenia, częstością stosowania i dawką produktu leczniczego.
- Czopków nie należy stosować u dzieci z biegunką.
- Nie stosować dawek większych niż zalecane.
- Podczas stosowania produktu nie należy pić alkoholu ani przyjmować leków zawierających alkohol.

Producent

UPSA SAS
3, rue Joseph Monier
92500 Rueil-Malmaison
Francja