

Efferalgan Forte 1 g, 8 tabletek musujących



Cena: 15,94 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	EFFERALGAN
Opakowanie	8 tabletek
Postać	Tabletka musująca
Producent	UPSA SAS
Przeznaczenie	Przecibólowe, Przeciwgorączkowe
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 15 lat

Opis produktu

Opis

Efferalgan Forte 1 g to lek o właściwościach przeciwbólowych i przeciwgorączkowych. Jego wygodna forma tabletek musujących przeznaczona jest do stosowania przez dorosłych oraz młodzież powyżej 15. roku życia.

Wskazania

Wskazaniami do stosowania tabletek musujących Efferalgan Forte są bóle różnego pochodzenia (bóle głowy, zębów, stawów, mięśni, bóle miesiączkowe, nerwobóle i inne) czy gorączka.

Działanie

Przecibólowe, przeciwgorączkowe.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież o masie ciała powyżej 50 kg (w wieku powyżej 15 lat): zalecana dawka jednorazowa leku Efferalgan Forte to 1 tabletka musująca (1 g paracetamolu), co 4 do 6 godzin do 3 razy na dobę.

Skład

1 tabletka musująca Efferalgan zawiera:

- substancję czynną: paracetamol (Paracetamolum) 1 g,
- pozostałe składniki: bezwodny kwas cytrynowy, wodorowęglan sodu, bezwodny węglan sodu, sorbitol (E420), dokuzynian sodu, powidon, sacharyna sodowa, benzoesan sodu (E211).

Przeciwwskazania

- Uczulenie (nadwrażliwość) na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników leku Efferalgan.

- Ciężka niewydolność wątroby lub czynna niewyrównana choroba wątroby.
- Niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej.
- Jednoczesne leczenie inhibitorami MAO (leki stosowane m.in. w depresji) oraz w okresie do 14 dni po zakończeniu tego leczenia.
- Nie stosować jednocześnie z lekami przeciwbólowymi o działaniu agonistycznoantagonistycznym: buprenorfiną, nalbufiną, pentazocyną.
- Nie stosować u dzieci o masie ciała mniejszej niż 50 kg.
- Nie stosować u kobiet w 1. trymestrze ciąży.

Działania niepożądane

Rzadko:

- obniżenie ciśnienia krwi.

Bardzo rzadko:

- częstoskurcz,
- nudności, wymioty,
- kolka nerkowa, martwica brodawek nerkowych, ostra niewydolność nerek.

Częstość nieznana:

- reakcja anafilaktyczna (w tym niedociśnienie), wstrząs anafilaktyczny, reakcje nadwrażliwości, obrzęk naczynioruchowy (obrzęk głębokich warstw skóry i tkanki podskórnej),
- biegunka, bóle brzucha,
- zwiększona aktywność aminotransferaz wątrobowych,
- trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi), leukopenia (zmniejszenie liczby białych krwinek), neutropenia (zmniejszenie liczby neutrofilów – typu białych krwinek),
- wysypka, rumień, pokrzywka, plamica, ostra uogólniona wysypka kropkowa, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, zespół Stevensa-Johnsona).

Ostrzeżenia

- Przed rozpoczęciem stosowania leku Efferalgan Forte należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.
- Ze względu na zawartość 1 g paracetamolu w 1 tabletkę musującej leku Efferalgan Forte nie stosuje się u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 15 lat.
- Lek Efferalgan Forte zawiera paracetamol i należy go stosować z uwzględnieniem jednoczesnego przyjmowania innych leków zawierających paracetamol (w tym leków wydawanych na receptę lub bez recepty), aby nie stosować dawki dobowej większej niż zalecana.
- Nie należy stosować dawek większych niż zalecane.
- Stosowanie dawek większych niż zalecane niesie ze sobą ryzyko bardzo ciężkiego uszkodzenia wątroby; objawy uszkodzenia pojawiają się zazwyczaj po jednym do dwóch dni od przedawkowania paracetamolu, z maksymalnym nasileniem występującym zazwyczaj po 3-4 dniach.
- Paracetamol może powodować ciężkie reakcje skórne, takie jak ostra uogólniona osutka kropkowa, zespół Stevensa-Johnsona oraz toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, które mogą być śmiertelne.
- Należy poinformować lekarza o wystąpieniu reakcji skórnych i zaprzestać stosowania leku w przypadku wystąpienia wysypki skórnej lub jakiegokolwiek innego objawu uczulenia.

Producent

BRISTOL-MEYERS SQUIBB POLSKA
Armii Ludowej 26
Warszawa