

Elmetacin 1%, 10 mg/g, aerozol do stosowania zewnętrznego, 50 ml

Cena: 58,64 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	ELMETACIN
Opakowanie	50 ml
Postać	Aerozol
Producent	STADA ARZNEIMITTEL AG
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwzapalne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Elmetacin to lek o właściwościach przeciwbólowych i przeciwzapalnych, który jest stosowany w terapii bólu po urazach, kontuzjach oraz w przypadkach zapalenia stawów.

Wskazania

Objawowe leczenie bólu towarzyszącego:

- stanom zapalnym stawów, np. zapalenie ścięgien, pochewek ścięgniętych, torebek stawowych, zeszczywnienie stawu barkowego,
- stanom zapalnym spowodowanym urazem, kontuzją (stłuczenia, skręcenia, zwichnięcia),
- zaostrzeniu choroby zwyrodnieniowej stawu.

Działanie

Elmetacin zawiera indometacynę, która należy do NLPZ, czyli niesteroidowych leków przeciwzapalnych, które hamują syntezę prostaglandyn (odpowiedzialnych m.in. za stan zapalny, ból). Wykazuje działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe.

Dawkowanie

Dorośli: lek stosuje się 3-5 razy na dobę. W zależności od wielkości bolesnego obszaru stosuje się od 0,5 ml do 1,5 ml np. 5 naciśnieć pompki do 15 razy (odpowiednio 4-12 mg indometacyny).

Skład

- Substancją czynną jest: indometacyna (Indometacinum).
- 1 g roztworu zawiera 10 mg indometacyny.
- Substancje pomocnicze: alkohol izopropylowy, izopropylu mirystynian.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Elmetacin:

- w przypadku uczulenia na substancję czynną - indometacynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- w przypadku występującego podrażnienia skóry, astmy, objawów alergicznych po zastosowaniu innych leków z grupy NLPZ (np. kwasu acetylosalicylowego),
- na otwarte rany, skórę zmienioną chorobowo, zakażoną, z egzemą, na błony śluzowe i do oczu!
- w przypadku choroby wrzodowej żołądka lub jelit.

Działania niepożądane

Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 100 osób):

- zaczerwienienie, wysypka, bąble, pieczenie, świąd.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1000 osób):

- działanie ogólnoustrojowe i/lub specyficzne dla narządów przy długotrwałym stosowaniu, na dużą powierzchnię ciała.

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób):

- kontaktowe zapalenie skóry,
- bóle i zawroty głowy,
- zaburzenia jelita i żołądka.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

- u osób wrażliwych - skurcz oskrzeli,
- nasilone zmiany łuszczykowe po miejscowym stosowaniu,
- podrażnienie błon śluzowych układu oddechowego przy inhalacji lekiem.

Ostrzeżenia

- Stosowanie leku należy omówić z lekarzem w przypadku pacjentów z astmą, katarem siennym, polipami nosa, POChP, przewlekłym zakażeniem układu oddechowego;
- Stosowanie leku omówić z lekarzem u pacjentów wykazujących nadwrażliwość na leki przeciwbólowe / przeciwreumatyczne; stosowanie leku zwiększa ryzyko napadu astmy (astma indukowana lekami przeciwbólowymi), miejscowego obrzęku skóry, obrzęku błon śluzowych, pokrzywki.
- Podczas stosowania leku należy chronić oczy i błony śluzowe.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
- Roztwór zawiera alkohol izopropylowy, który jest substancją łatwopalną!
- Termin ważności po pierwszym użyciu – 12 miesięcy.

Producent

STADA
Al. 3 Maja 6
Piaseczno

Galeria

