

Eloprine, 500 mg, tabletki, 50 tabletek

Cena: 57,18 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	ELOPRINE
Opakowanie	50 tabletek
Postać	Tabletki
Producent	POLFARMEX S.A.
Przeznaczenie	Uodparniające
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Eloprine to lek o działaniu przeciwwirusowym, który wspomaga funkcje układu odpornościowego.

Wskazania

Lek Eloprine stosuje się:

- wspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających zakażeń górnych dróg oddechowych,
- w leczeniu opryszczki warg i skóry twarzy, jeśli w przeszłości rozpoznano zakażenie wirusem Herpes Simplex.

Działanie

Eloprine zawiera inozyny pranobeks, który wykazuje działanie immunostymulujące i przeciwwirusowe.

Dawkowanie

Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat):

- Zwykle stosowana dawka dobową wynosi 6 tabletek w ciągu doby (czyli 2 tabletki 3 razy na dobę).
- Maksymalna dawka dobową to 8 tabletek w ciągu doby (czyli 2 tabletki 4 razy na dobę).

Dzieci w wieku powyżej 1 roku:

- Zalecana dawka to 50 mg na kg masy ciała na dobę, podawana w kilku równych dawkach podzielonych.

Skład

- Substancją czynną leku jest inozyny pranobeks (Inosinum pranobexum).

- Jedna tabletka polwlekana zawiera 500 mg inozyiny pranobeksu w postaci kompleksu.

(kompleks zawierający inozynę soli kwasu 4-acetamidobenzoowego z N,N-2-dimetyloamino-2-propanolem w stosunku molowym 1:3).

- Substancje pomocnicze: mannitol, skrobia ziemniaczana, powidon K-25, magnezu stearynian.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Eloprine:

- jeśli pacjent ma uczulenie na inozyny pranobeks lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- jeśli pacjent ma aktualnie napad dny moczanowej lub badania wykazały zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi.

Działania niepożądane

Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 osób na 100):

- przemijające zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi,
- podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych lub stężenia azotu mocznikowego we krwi,
- nudności z wymiotami lub bez, bóle w nadbrzuszu,
- świąd skóry, wysypka skórna,
- bóle głowy, zawroty głowy,
- zmęczenie lub złe samopoczucie,
- bóle stawów.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 osób na 1 000):

- biegunka, zaparcia,
- nerwowość, senność lub trudności w zasypianiu,
- zwiększona objętość moczu.

Ostrzeżenia

Przed rozpoczęciem stosowania Eloprine należy omówić to z lekarzem:

- jeśli pacjent miał w przeszłości napady dny moczanowej lub zwiększone stężenia kwasu moczowego we krwi lub w moczu,
- jeśli pacjent miał w przeszłości kamicę nerkową,
- jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek, w takim przypadku lekarz będzie uważnie kontrolował pacjenta.

Producent

POLFARMEX
Józefów 9
Kutno

Galeria





APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943