

Eloprine Forte syrop 0,5 g/5ml 150 ml



Cena: 27,25 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	ELOPRINE
Opakowanie	150 ml
Postać	Syrop
Producent	POLFARMEX S.A.
Przeznaczenie	Infekcja, Obniżona odporność, Przeziębienie
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 1 roku życia

Opis produktu

Opis

Eloprine Forte to lek, w którym składzie znajdują się inozyny pranobeks. Ta substancja aktywna wykazuje zdolność do zwalczania wirusów oraz wspierania działania układu odpornościowego.

Wskazania

- Działanie wspomagające przy obniżonej odporności.
- W przypadku nawracających zakażeń górnych dróg oddechowych.

Działanie

Inozyny pranobeks jest syntetyczną pochodną puryny. Wykazuje działanie immunostymulujące i przeciwwirusowe, które wynika z wyraźnego pobudzenia odpowiedzi odpornościowej gospodarza in vivo pod wpływem działania produktu leczniczego.

Dawkowanie

- Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat):

Zwykle stosowana dawka dobową wynosi 30 ml syropu na dobę, podawane w 3 lub 4 dawkach podzielonych. Dawka maksymalna wynosi 40 ml syropu na dobę.

- Dzieci w wieku powyżej 1 roku:

Zazwyczaj zalecana dawka wynosi 50 mg/kg masy ciała na dobę (0,5 ml syropu na 1 kg masy ciała na dobę) w 3 lub 4 równych podzielonych dawkach podawanych w ciągu doby.

Przeciwwskazania

- Należy unikać stosowania leku w przypadku nadwrażliwości na inozyliny pranobeks lub dowolny z pozostałych składników preparatu.
- W sytuacji występowania ataku dny moczanowej lub wyników badań wskazujących na podwyższone stężenie kwasu moczowego we krwi, nie jest zalecane stosowanie tego leku.
- Lek Eloprine Forte nie powinien być używany u dzieci w wieku poniżej 1 roku.
- W okresie ciąży i laktacji nie należy sięgać po lek Eloprine Forte, chyba że zalecenie lekarza jest inne.

Działania niepożądane

- przemijające zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi,
- podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych lub stężenia azotu mocznikowego we krwi,
- nudności z wymiotami lub bez,
- bóle w nadbrzuszu,
- świąd skóry,
- wysypka skórna,
- bóle głowy,
- zawroty głowy,
- zmęczenie lub złe samopoczucie,
- bóle stawów.

Ostrzeżenia

- Jeśli pacjent doświadczył napadów dny moczanowej lub obserwowano wzrost poziomu kwasu moczowego we krwi i moczu.
- Lek Eloprine Forte może spowodować przejściowe zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi i moczu.
- Jeśli pacjent cierpiał na kamicy nerkowej.
- W przypadku występowania zaburzeń funkcji nerek.