

Eloprine syrop 0,25 g/5ml - 150 ml



Cena: 22,07 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	150 ml
Postać	Syrop
Producent	POLFARMEX S.A.
Przeznaczenie	Uodparniające
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 1 roku życia

Opis produktu

Opis

Eloprine to lek o działaniu przeciwwirusowym, który wspomaga funkcjonowanie układu odpornościowego.

Wskazania

Lek Eloprine stosuje się:

- wspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających zakażeń górnych dróg oddechowych,
- w leczeniu opryszczki warg i skóry twarzy, jeśli w przeszłości rozpoznano zakażenie wirusem Herpes Simplex.

Działanie

Eloprine zawiera inozyny pranobeks, który wykazuje działanie immunostymulujące i przeciwwirusowe.

Dawkowanie

- Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat):

Zwykle stosowana dawka dobową wynosi 60 ml syropu na dobę, podawane w 3 lub 4 dawkach podzielonych. Dawka maksymalna wynosi 80 ml syropu na dobę.

- Dzieci w wieku powyżej 1 roku:

Zazwyczaj zalecana dawka wynosi 50 mg/kg masy ciała na dobę (1 ml syropu na 1 kg masy ciała na dobę) w 3 lub 4 równych podzielonych dawkach podawanych w ciągu doby.

Skład

Substancją czynną leku jest inozyny pranobeks (kompleks zawierający inozynę oraz 4-acetamidobenzoesan



2-hydroksypropylodlmetryloamoniowy w stosunku molarnym 1:3).

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Eloprine:

- jeśli pacjent ma uczulenie na inozyny pranobeks lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- jeśli pacjent ma aktualnie napad dny moczanowej lub badania wykazały zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi.

Działania niepożądane

Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 osób na 100):

- przemijające zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi,
- podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych lub stężenia azotu mocznikowego we krwi,
- nudności z wymiotami lub bez, bóle w nadbrzuszu,
- świąd skóry, wysypka skórna,
- bóle głowy, zawroty głowy,
- zmęczenie lub złe samopoczucie,
- bóle stawów.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 osób na 1 000):

- biegunka, zaparcia,
- nerwowość, senność lub trudności w zasypianiu,
- zwiększona objętość moczu.

Ostrzeżenia

Przed rozpoczęciem stosowania Eloprine należy omówić to z lekarzem:

- jeśli pacjent miał w przeszłości napady dny moczanowej lub zwiększone stężenia kwasu moczowego we krwi lub w moczu,
- jeśli pacjent miał w przeszłości kamicę nerkową,
- jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek, w takim przypadku lekarz będzie uważnie kontrolował pacjenta.

Producent

POLFARMEX
Józefów 9
Kutno