

Enfamil 2 PREMIUM LIPIL DHA - mleko następne dla niemowląt, 6-12 miesięcy, 800 g



Cena: 122,09 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka
Marka	ENFAMIL
Opakowanie	800 g
Postać	Proszek
Producent	MEAD JOHNSON NUTRITION (POLAND)SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Odżywcze
Rodzaj produktu	Żywność
Wiek	Dla dziecka

Opis produktu

Opis

Enfamil 2 PREMIUM LIPIL DHA to mleko następne w formie płynnej, stworzone z myślą o niemowlątach w wieku od 6. do 12. miesiąca życia. Zawiera zestaw witamin, minerałów oraz cennych kwasów tłuszczowych DHA i EPA, które wspierają prawidłową pracę serca. Produkt zalecany jest jako uzupełnienie diety, zgodnie z indywidualnymi wskazaniami lekarza. Wprowadzenie mleka modyfikowanego powinno odbywać się po konsultacji ze specjalistą, a karmienie piersią pozostaje najlepszym sposobem żywienia niemowląt.

Skład

Odłuszczone mleko, syrop glukozowy, oleje roślinne (oleina palmowa, olej kokosowy, olej sojowy, wysokooleinowy olej słonecznikowy), laktoza (z mleka), galaktooligosacharydy (GOS, z mleka), polidekstroza, emulgator (lecytyna sojowa), węglan wapnia, oleje pozyskiwane z organizmów jednokomórkowych (ARA z *Mortierella alpina* i DHA z *Cryptocodinium cohnii*), L-askorbinian sodu, chlorek choline, wodorotlenek potasu, siarczan żelaza, tauryna, fosforan magnezu, inozytol, cytydino-5-monofosforan, siarczan cynku, octan DL-alfa-tokoferolu, 6-palmitynian-L-askorbylu, nikotynamid, urydino-5-monofosforan, adenozylo-5-monofosforan, guanozylo-5-monofosforan, D-pantotenian wapnia, siarczan miedzi, palmitynian retinylu, ryboflawina, chlorowodorek tiaminy, cholekalcyferol, chlorowodorek pirydoksyny, siarczan manganu, kwas foliowy, fitomenadion, jodek sodu, selenian sodu, D-biotyna, cyjanokobalamina

Sposób użycia

Przed rozpoczęciem przygotowywania pokarmu dokładnie umyj ręce wodą z mydłem. Umyj i wygotuj w wodzie butelki, smoczki, nakrętki i naczynia (przez co najmniej 5 minut we wrzącej wodzie). Przed dodaniem proszku gotuj świeżą wodę przez co najmniej 5 minut, a następnie pozostaw aż ostygnie do temperatury pokojowej. Wlej wskazaną ilość ostudzonej wody do butelki. Do wody dodaj proszek. Zakręć butelkę. Dokładnie wymieszaj zawartość butelki ruchem obrotowym, a następnie wstrząsając do całkowitego rozpuszczenia proszku. Sprawdź temperaturę wytrząsając kilka kropel na swój nadgarstek – preparat powinien być letni.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dodatkowe informacje

- Mieszanki w proszku przeznaczone dla niemowląt nie są jałowe i nie powinny być stosowane u wcześniaków i dzieci z zaburzeniami odporności, chyba że na polecenie i pod ścisłym nadzorem lekarza pediatry.
- Należy zawsze skontaktować się ze swoim lekarzem pediatrą w celu wybrania właściwej mieszanki dla Twojego dziecka.
- Proszek po rozpuszczeniu w wodzie szybko się psuje.
- Mieszanke należy podać zaraz po przygotowaniu.
- Po upływie godziny od rozpoczęcia karmienia, pozostałą w butelce mieszanke należy wylać, a przybory i naczynia umyć.
- Nie zamrażać przygotowanej mieszanki.
- Nie należy podgrzewać pokarmu w kuchence mikrofalowej, gdyż może to doprowadzić do poważnych poparzeń.
- Świeżo przygotowaną mieszanke można podgrzać w butelce, w specjalnie do tego przystosowanym podgrzewaczu lub łaźni wodnej.
- Odmierzaj proszek wyłącznie za pomocą miarki dołączonej do opakowania. Przechowuj suchą miarkę w opakowaniu.
- Nie ugniataj proszku w miarce. Nadmiar proszku usuń tępą stroną czystego i suchego noża.
- Nie należy zmieniać stosowanej mieszanki ani wprowadzać produktów uzupełniających bez konsultacji z lekarzem.
- Karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia niemowląt.
- Enfamil Premium 2 przeznaczony jest dla niemowląt od 6. miesiąca życia i nie powinien być podawany jako substytut mleka przez pierwsze 6 miesięcy życia dziecka.
- Enfamil Premium 2 jest ważnym elementem coraz bardziej urozmaiconej diety i powinien stanowić podstawę żywienia podczas wprowadzania produktów uzupełniających do diety Twojego dziecka, zgodnie z zaleceniami lekarza.
- Zawiera syrop glukozowy.
- Podczas przygotowania pokarmu ważną rolę odgrywa przestrzeganie zasad higieny, instrukcji sporządzania, rozcieńczania, podawania i przechowywania.
- Puszkę należy przechowywać w suchym miejscu w temperaturze 15-25°C.
- Po otwarciu puszkę należy szczelnie zamykać, przechowywać w suchym miejscu i zużyć w ciągu 1 miesiąca. Proszku nie wolno zamrażać i należy chronić nadmiernym nagrzaniem.

Producent

Mead Johnson Nutrition sp. z o.o.
Al. Armii Ludowej 26,
00-609 Warszawa

Galeria

