

Enfamil 4 PREMIUM MFGM - mleko modyfikowane dla dzieci powyżej 2 roku życia, 800 g



Cena: 14,67 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka
Opakowanie	800 g
Postać	Proszek
Producent	MEAD JOHNSON NUTRITION (POLAND)SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Odżywcze
Rodzaj produktu	Żywność
Wiek	Dla dziecka

Opis produktu

Opis

Enfamil 4 PREMIUM MFGM to zaawansowana formuła witamin, minerałów i innych składników odżywczych, wspomagająca codzienną dietę dzieci. Rekomenduje się stosowanie preparatu dwa razy dziennie, zgodnie z zaleceniami specjalisty. Włączenie produktu do jadłospisu powinno być poprzedzone konsultacją lekarską. Należy pamiętać, że karmienie piersią pozostaje najlepszym sposobem żywienia niemowląt i małych dzieci.

Skład

Pełne mleko, syrop glukozowy, odtłuszczone mleko, sacharoza, inulina, laktoza (z mleka), oligofruktoza, węglan wapnia, olej (z ryb), o wysokiej zawartości DHA, dwuwinitol cholicy, emulgator (lecytyna sojowa), cytrynian potasu, L-askorbinian sodu, fosforan magnezu, chlorek sodu, beta glukan z drożdży piekarskich, siarczan żelaza, tauryna, octan DL-alfa-tokoferolu, siarczan cynku, nikotynamid, kwas L-askorbinowy, etylowanilina, D-pantotenian wapnia, siarczan miedzi, chlorowodorek tiaminy, palmitynian retinolu, chlorowodorek pirydoksyny, cholekalcyferol, ryboflawina, siarczan manganu, kwas foliowy, fitomenadion, D-biotyna, cyjanokobalamina.

Sposób użycia

Ilość wody i proszku konieczną do użycia, należy odczytać z tabeli umieszczonej na opakowaniu. W zależności od wieku dziecka należy rozpuścić 4 płaskie miarki w 240ml wody, podawać 1-2 posiłki na dobę. Proszek należy odmierzać za pomocą miarki dołączonej do opakowania. Nie należy ugniatać proszku w miarce. Nadmiar proszku należy usunąć z miarki tępą stroną czystego i suchego noża. Przed rozpoczęciem przygotowania pokarmu dokładnie umyć ręce wodą z mydłem. Przed dodaniem proszku gotuj świeżą wodę przez co najmniej 5 minut, a następnie pozostaw aż ostygnie do temperatury pokojowej. Wlej zgodną z tabelą ilość ostudzonej wody do butelki/kubka i dodaj odpowiednią ilość proszku. Zamknij butelkę/kubek nakrętką i dokładnie wymieszaj do całkowitego rozpuszczenia. Sprawdź temperaturę wytrząsając kilka kropel na swój nadgarstek.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skonsultować

się z lekarzem lub farmaceutą.

Dodatkowe informacje

- Podczas przygotowywania pokarmu ważną rolę odgrywa przestrzeganie zasad higieny, instrukcji sporządzania, rozcieńczania, podawania i przechowywania.
- Mieszanekę należy podać natychmiast po przygotowaniu.
- Po upływie godziny od rozpoczęcia karmienia, pozostałą w butelce lub kubku mieszanekę należy wylać, a przybory i naczynia umyć.
- Do odmierzania proszku należy używać wyłącznie dołączonej miarki. Po użyciu suchą miarkę należy przechowywać w puszcze do następnego wykorzystania.
- Nie należy podgrzewać pokarmu w kuchence mikrofalowej, gdyż może to doprowadzić do poważnych poparzeń.
- Opakowanie należy przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze 15-25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
- Po każdym użyciu foliowa torebka powinna być szczelnie zamknięta.
- Zawartość otwartego opakowania foliowego powinna być zużyta w ciągu 1 miesiąca.
- Proszku nie wolno zamrażać i należy chronić przed nadmiernym nagrzaniem.
- Produkt pakowany w atmosferze ochronnej.
- Produkt powinien być tylko jednym z elementów urozmaiconej diety.
- Preparat nie może być stosowany jako produkt zastępujący mleko matki.

Producent

Mead Johnson B.V.
Middenkampweg 2
6545 CJ Nijmegen, Niemcy

Galeria

