

EnterosGel 225 g



Cena: 103,42 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	225 g
Postać	Żel
Producent	K & K HERBAL POLAND
Przeznaczenie	Biegunka, IBS (zespół jelita drażliwego), Zapalenie, Zatrucie pokarmowe, Zespół jelita drażliwego
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 1 roku życia

Opis produktu

Opis

Enterosgel to innowacyjny jelitowy adsorbent, który jest klasyfikowany jako wyrób medyczny klasy IIa. Jego główną funkcją jest wiązanie toksyn, szkodliwych substancji, patogenów i alergenów w przewodzie pokarmowym, a następnie usuwanie ich z organizmu. Enterosgel jest szczególnie korzystny jako środek wspomagający leczenie chorób biegunkowych.

Detoksykacja, czyli proces usuwania szkodliwych substancji, takich jak toksyny i patogeny, z przewodu pokarmowego, jest istotnym krokiem w rekonwalescencji, osiągnięciu optymalnego zdrowia i długowieczności. Substancją czynną wyrównania medycznego Enterosgel jest organosilikonowy polimer o nazwie polihydrat polimetylosiloksanu, który ma porowatą strukturę. Dzięki tej strukturze Enterosgel może wiązać szkodliwe substancje na swojej powierzchni i eliminować je z organizmu. Proces detoksykacji poprawia ogólny stan zdrowia, normalizuje trawienie, wzmacnia odporność na infekcje i wspiera optymalne funkcjonowanie organizmu.

Dawkowanie

- Dorośli i dzieci powyżej 15 roku życia: 15–22,5 g 3x dziennie (15 g = 1 łyżka stołowa).
- Dzieci w wieku 7–14 lat: 10 g 3x dziennie (10 g = 2 łyżeczki od herbaty).
- Dzieci w wieku 1–6 lat: 5 g 3x dziennie (5 g = 1 łyżeczka od herbaty).

Składniki

Polihydrat polimetylosiloksanu 70%, woda oczyszczona 30%.

Zastosowanie

U dzieci i dorosłych w następujących wskazaniach: ostre zapalenie żołądka i jelit (choroby biegunkowe) u dorosłych i dzieci, choroby alergiczne z objawami żołądkowo-jelitowymi u dorosłych i dzieci, zespół drażliwego jelita typu biegunkowego (IBS-D).

Przeciwwskazania



- Nie należy stosować wyrobu medycznego u osób stosujących jednocześnie leki doustne o modyfikowanym (kontrolowanym) uwalnianiu, u osób cierpiących na atonię jelit (poważne zaparcia wywołane przez obstrukcję jelit) lub niedrożność jelit oraz u osób z nietolerancją preparatu stosowanego w przeszłości.
- Nie należy używać wyrobu w razie ostrego zatrucia chemicznego, zatrucia lekami lub w razie przedawkowania leków.
- Nie używać po upływie daty ważności.

Ważne wskazówki

- Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze od 4°C do 30°C.
- Nie narażać na działanie wysokich temperatur ani bezpośredni kontakt z promieniami słońca.
- Tubę należy dobrze wstrząsnąć przed otwarciem i przed każdym użyciem.
- Zużyć w ciągu 30 dni po otwarciu tuby.