

Envil gardło, tabletki do ssania, 20 tabletek

Cena: 23,48 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	Envil
Opakowanie	20 tabletek
Postać	Tabletki do ssania
Producent	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwbakteryjne, Przeciwbólowe, Przeciwwgrzybicze
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Envil gardło to tabletki do ssania stosowane pomocniczo przy anginie.

Wskazania

Lek Envil gardło może być stosowany pomocniczo w leczeniu zakażeń górnych dróg oddechowych przebiegających z bólem gardła oraz w zapaleniu migdałków (angina).

Działanie

Lek Envil gardło ma działanie antyseptyczne (odkażające) i miejscowo znieczulające.

Dawkowanie

- Dorośli: ssać powoli jedną tabletkę co 1 lub 2 godziny. nie przekraczać dawki 8 tabletek na dobę.
- Dzieci od 6 roku życia: ssać powoli jedną tabletkę co 2 lub 3 godziny. Nie przekraczać dawki 6 tabletek na dobę. nie przyjmować leku w czasie posiłku. Najlepiej godzinę przed lub po posiłku.

Skład

1 tabletkę zawiera:

- Substancje czynne: 1,5 mg chlorku cetylopirydyniowego, 1,0 mg chlorowodorku lidokainy i 17,42 mg cynku glukonianu (co odpowiada 2,5 mg jonów cynku).
- Substancje pomocnicze: mentol, celuloza mikrokrystaliczna, poliwinylpirolidon, aspartam, kwas cytrynowy bezwodny, kroscarmeloza sodowa, talk, magnezu stearynian, glicerol 99,5%.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Envil gardło:

- jeśli pacjent ma uczulenie na którykolwiek ze składników leku
- jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby lub nerek
- jeśli pacjent choruje na methemoglobinemię
- u dzieci w wieku poniżej 6 lat

Działania niepożądane

- Niezbyt często (występują u 1 do 10 osób na 1 000): miejscowe reakcje skórne, takie jak: rumień, świąd, wyprysk, pieczenie.
- Rzadko (występują u 1 do 10 osób na 10 000): ciężkie reakcje skorne, takie jak: wyprysk pęcherzowy lub pryszczowaty, które mogą rozprzestrzeniać się lub być uogólnione; pokrzywka; nadwrażliwość na światło słoneczne; ból głowy; zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, bóle brzucha, biegunka); wymioty, metaliczny smak w ustach; zapalenie błony śluzowej jamy ustnej.
- Bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 osoby na 10 000): nasilenie występującej wcześniej niewydolności nerek.
- Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): drgawki.

Ostrzeżenia

- Lek zawiera aspartam, który jest źródłem fenylalaniny i nie powinien być stosowany u pacjentów chorych na fenylketonurię.
- Lek zawiera mannitol, który może powodować podrażnienie żołądka oraz biegunkę.

Producent

AFLOFARM
Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice
aflofarm@aflofarm.pl

Galeria

