

Erazaban 10 % (100 mg/g), krem, 2 g (tuba)

Cena: 29,39 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	2 g
Postać	krem
Producent	MAXIMA HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwwirusowe
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Erazaban to środek stosowany w terapii opryszczki, który zapobiega przedostawaniu się wirusa do nienaruszonych komórek skóry. Substancją aktywną preparatu jest dokożanol naturalny komponent błon komórkowych występujących w organizmie człowieka.

Wskazania

Lek Erazaban jest stosowany w leczeniu wczesnych objawów wargowych nawracających zakażeń wirusem opryszczki zwykłej - Herpes simplex, u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12lat.

Działanie

Substancja czynna leku Erazaban blokuje wnikanie do zdrowych komórek skóry wirusów takich jak wirus opryszczki. W ten sposób zapobiega namnażaniu się wirusa, dzięki czemu skraca czas trwania i może łagodzić przebieg opryszczki. Zmniejsza uciążliwe objawy opryszczki, takie jak: ból, mrowienie, kłucie oraz świąd.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież powyżej 12. roku życia: zewnętrznie, nałożyć ostrożnie cienką warstwę kremu na całą powierzchnię zmian opryszczkowych pięć razy na dobę (w odstępach około 3 godzin w ciągu dnia).

Skład

- Substancją czynną leku jest dokonazol (Doconazolum)
- 1 g kremu zawiera 100 mg dokożanolu.
- Substancje pomocnicze: sacharozy stearynian i distearynian, lekki olej mineralny, glikol propylenowy,

alkohol benzylowy i woda oczyszczona.

Działania niepożądane

Bardzo częste (więcej niż 1 na 10 pacjentów):

- ból głowy.

Częste (więcej niż 1 na 100 pacjentów):

- zaburzenia skóry obejmujące suchość skóry, wysypki oraz obrzęk twarzy występujące w miejscu nałożenia kremu.

Ostrzeżenia

- Erazaban działa najskuteczniej, gdy zostanie zastosowany w chwili wystąpienia wczesnych objawów opryszczki.
- Erazaban zawiera glikol propylenowy, który może powodować podrażnienie skóry.
- Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby - 6 miesięcy.
- Nie należy stosować leku, jeśli u pacjenta stwierdzono obniżenie odporności (np. przez ciężkie choroby takie jak białaczka, AIDS lub po przeszczepie narządu). Jeśli u pacjenta z obniżoną odpornością rozwija się opryszczka, powinien on natychmiast skonsultować się z lekarzem.
- Lek Erazaban jest przeznaczony jest wyłącznie do stosowania na skórę. Należy unikać dostania się kremu do lub w okolice oczu, ponieważ może to spowodować podrażnienie. W przypadku przypadkowego przedostania się kremu do oczu należy je starannie przepłukać dużą ilością wody.

Producent

JELFA
Wincentego Pola 21
Jelenia Góra