


Erdomed SASZETKI 0,225g 20 saszetek

Cena: 31,61 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	ERDOMED
Opakowanie	20 saszetek
Postać	Proszek
Producent	ANGELINI PHARMA POLSKA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Kaszel, Stan zapalny, Zatok
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 18 lat

Opis produktu

Opis

Erdomed Muko to lek w postaci proszku do sporządzania zawiesiny doustnej, który jest stosowany jako wspomaganie leczenia ostrych i przewlekłych schorzeń dróg oddechowych. Przeznaczony jest do rozrzedzenia i ułatwienia wykrztuszania śluzowej wydzieliny z nosa, zatok, krtani, tchawicy, oskrzeli oraz płuc. Lek może być stosowany u dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia.

Substancją czynną w Erdomed Muko jest erdosteina, która wykazuje wielokierunkowe działanie. Erdosteina szybko się wchłania i nie ma wpływu na błonę śluzową żołądka, co sprawia, że lek jest bezpieczny dla pacjentów z chorobą wrzodową żołądka. W jednej saszetce znajduje się 225 mg erdosteiny.

Wskazania

Leczenie wspomagające w ostrych i przewlekłych chorobach zapalnych dróg oddechowych: nosa, zatok przynosowych, krtani, tchawicy, oskrzeli i płuc z towarzyszącym nadmiernym wydzielaniem śluzu.

Działanie

Rozrzedzające wydzielinę, ułatwiające odkrztuszenie, łagodzące kaszel mokry.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek do stosowania doustnego, po sporządzeniu rzadkiej, mętnej zawiesiny przez wymieszanie zawartości saszetki w 120 ml (około pół szklanki) wody o temperaturze pokojowej. Zawiesinę należy spożyć bezpośrednio po przygotowaniu. Ze względu na działanie wykrztusne leku, nie należy go stosować przed snem. Należy skonsultować się z lekarzem, w przypadku gdy po 3 dniach terapii pacjent czuje się gorzej albo nie nastąpiła poprawa.

Zwykle stosowane dawkowanie leku Erdomed Muko u dzieci w wieku powyżej 12 lat to 1 saszetka 2 razy na dziennie, natomiast u osób dorosłych jest to 1 saszetka 2 lub 3 razy na dobę.

Przeciwwskazania

- U pacjentów, którzy są nadwrażliwi na substancję czynną (erdosteinę), którąkolwiek substancję pomocniczą zawartą w leku lub na substancje zawierające wolne grupy SH, takie jak acetylocysteina. Osoby uczulone na te składniki powinny unikać stosowania leku Erdomed Muko.
- U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. W takich przypadkach należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku.
- U pacjentów z niewydolnością nerek, o klirensie kreatyniny mniejszym niż 25 ml/min. Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.
- U pacjentów z homocystynurią, co jest rzadką dziedziczną chorobą metaboliczną. W przypadku tej choroby należy unikać stosowania leku Erdomed Muko.
- U dzieci poniżej 12 roku życia. Lek jest przeznaczony do stosowania wyłącznie u dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 100 pacjentów): ból w nadbrzuszu, nudności, ból głowy.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1000 pacjentów): zgaga, zaparcie, biegunka, suchość jamy ustnej, zawroty głowy, ogólne złe samopoczucie.

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 pacjentów): brak odczuwania smaku lub zaburzenia smaku, objawy alergii: wysypka, pokrzywka, gorączka.

Interakcje

- Nie obserwowano klinicznie istotnych, niekorzystnych interakcji między Erdomed Muko a innymi lekami stosowanymi w leczeniu zakażeń dróg oddechowych i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, takimi jak teofilina, leki powodujące rozkurcz mięśni gładkich oskrzeli (kortykosteroidy), erytromycyna, amoksycylina lub kotrimoksazol.
- Po podaniu erdosteiny (substancji czynnej w Erdomed Muko) zaobserwowano zwiększenie stężenia amoksycyliny w drogach oddechowych. Dlatego istotne jest poinformowanie lekarza o przyjmowaniu amoksycyliny lub innych leków przeciwbakteryjnych.
- Nie należy stosować Erdomed Muko jednocześnie z lekami przeciwkaszlowymi, ponieważ mogą one osłabiać odruch kaszlu i utrudniać odkrztuszanie rozrzedzonej wydzieliny.

Ostrzeżenia

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów nadwrażliwości, takich jak wysypka, pokrzywka, należy przerwać stosowanie leku Erdomed Muko i skonsultować się z lekarzem.

Osoby z zaburzeniami oczyszczania rzęskowego lub osłabionym odruchem kaszlowym powinny ostrożnie stosować ten lek.

Należy zwrócić uwagę, że Erdomed Muko zawiera sacharozę (3,5 g w 1 saszetce) i glukozę. Osoby z cukrzycą powinny być świadome tego składnika. Pacjenci z nietolerancją niektórych cukrów powinni skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.