

Esberitox N, 0,215 ml, tabletki, 50 tabletek

Cena: 31,64 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	50 tabletek
Postać	Tabletki
Producent	SCHAPER & BRUMMER GMBH & CO. KG
Przeznaczenie	Uodparniające
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Esberitox N to preparat ziołowy wspierający organizm w walce z objawami przeziębienia. Występuje w formie tabletek, które zawierają ekstrakty roślinne z żywotnika zachodniego, jeżówki purpurowej oraz dzikiego indygo – składników znanych ze swoich właściwości wspomagających odporność.

Wskazania

Esberitox N w leczeniu przeziębienia jako środek wspomagający, skracający czas infekcji i łagodzący jej przebieg.

Dawkowanie

- Dzieci od 4 do 6 lat: 1 tabletki 3 razy dziennie
- Dzieci od 6 do 12 lat: 2 tabletki 3 razy dziennie
- Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 3 tabletki 3 razy dziennie

Skład

- Substancją czynną leku jest wyciąg z: ziela żywotnika zachodniego, korzenia jeżówki purpurowej i korzenia dzikiego indygo - Extractum spissum ex: (Baptisiae tinctoriae radice + Echinaceae purpureae radice + Thujae occidentalis herba) (1:11), ekstrahent: etanol 30% (v/v.)
- 1 tabletki zawiera 0,215 ml wyciągu odpowiadającego: Baptisiae tinctoriae radice (korzeń dzikiego indygo) - 10 mg, Echinaceae purpureae radice (korzeń jeżówki purpurowej) - 7,5 mg, Thujae occidentalis herba (ziele żywotnika zachodniego) - 2 mg
- Substancje pomocnicze: laktoza, stearynian magnezu, makrogol 6000, sacharoza.

Przeciwwskazania

Nie stosować leku Esberitox N :

- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na ziele żywotnika zachodniego (Thujae occidentalis herba), korzeń jeżówki

purpurowej (Echinaceae purpureae radice), korzeń dzikiego indygo (Baptisiae tinctoriae radice) lub na rośliny pokrewne do korzenia jeżówki, tj. inne rośliny z tej samej rodziny botanicznej (Compositae/Asteraceae – np. rumianek, arnika), lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku;

- w przypadku postępujących chorób ogólnoustrojowych takich jak: gruźlica, białaczka, AIDS, zarażenie wirusem HIV, kolagenoza (choroba zapalna oddziałująca na tkankę łączną), stwardnienie rozsiane i inne choroby autoimmunologiczne (wytworzenie przeciwciał przeciw tkankom własnego organizmu);
- w przypadku immunosupresji (obniżenia odporności organizmu np. w przypadku terapii lekami onkologicznymi, po transplantacji organów lub szpiku kostnego).

Działania niepożądane

Podczas stosowania może wystąpić reakcja nadwrażliwości (uczuleniowa). W trakcie stosowania produktów zawierających w swoim składzie jeżówkę obserwowano: wysypkę na skórze, świąd (swędzenie), obrzęk (opuchlizna) twarzy, duszności, zawroty głowy i spadek ciśnienia krwi. W przypadku zaobserwowania takich objawów należy niezwłocznie przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem. Mogą wystąpić zaburzenia żołądka i jelit (ból brzucha, wymioty, biegunka).

Ostrzeżenia

- Jeśli objawy choroby nasilają się lub utrzymują dłużej niż 10 dni, lub jeśli pojawia się duszność, gorączka lub ropyjące bądź krwawiące wydzieliny, należy skontaktować się z lekarzem.
- Lek Esberitox N zawiera laktozę i sacharozę (cukier). W przypadku nietolerancji niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Producent

SCHAPER & BRUMMER
Bahnhofstraße 35
Salzgitter, Niemcy