

Espumisan, 100 mg/ml, krople doustne, 30 ml (import równoległy, InPharm)

Cena: 30,48 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	30 ml
Postać	Krople
Producent	INPHARM SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Wiatropędne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla niemowlaka, Dla seniorów, Od 1 miesiąca życia

Opis produktu

Opis

Espumisan 100 mg/ml to krople doustne przeznaczone dla niemowląt i dorosłych. Zawierają symetykon, który stosuje się w objawowym leczeniu zaburzeń przewodu pokarmowego oraz jako pomoc w przygotowaniach do badań diagnostycznych.

Wskazania

Espumisan 100 mg/ml stosuje się:

- podczas objawowego leczenia zaburzeń żołądkowo-jelitowych, związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów takich jak, np.: wzdęcia lub nasilone powstawanie gazów w przewodzie pokarmowym;
- po konsultacji z lekarzem w przypadku leczenia zaburzeń żołądkowo-jelitowych, związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów takich jak, np.: wzdęcia lub nasilone powstawanie gazów w przewodzie pokarmowym;
- po konsultacji z lekarzem także jako środek pomocniczy w przygotowaniu i samych badaniach diagnostycznych jamy brzusznej (np. w celu redukcji cieni wywołanych gazami w badaniach radiologicznych, ultrasonograficznych; badania endoskopowe; jako dodatek do zawiesiny środka kontrastowego).

Działanie

Substancja czynna Espumisan 100 mg/ml, symetykon, powoduje pękanie pęcherzyków gazu, zawartych w masach pokarmowych i w śluzie przewodu pokarmowego. Dzięki temu gazy, uwolnione na tej drodze, mogą być wchłaniane przez ścianę jelita lub usuwane z przewodu pokarmowego w wyniku ruchów perystaltycznych jelit.

Dawkowanie

- Niemowlęta powyżej 1 miesiąca życia: 1ml - 2 ml (20 - 40 kropeł), co odpowiada 40-80mg symetykonu, na dobę w 2 (2 razy na

dobę po 10-20 kropel) do 4 (4 razy na dobę po 5-10 kropel) dawkach podzielonych, całkowita dawka dobową nie większą niż 80mg, lek Espumisan należy dodać do butelki z mlekiem lub podać na łyżeczce przed lub po karmieniu piersią.

- Dzieci od 1 do 6 lat: 1ml (20 kropel), co odpowiada 40mg symetykonu, 3 do 5 razy na dobę.
- Dzieci od 6 do 14 lat: 1ml - 2ml (20 - 40 kropel), co odpowiada 40-80mg symetykonu, 3 do 5 razy na dobę.
- Młodzież i dorośli: 2ml (40 kropel), co odpowiada 40mg symetykonu, 3 do 5 razy na dobę.

Skład

Substancją czynną leku jest symetykon.

Substancje pomocnicze: Makrogolu stearynian, glicerolu monostearynian 40-55, kwas sorbinowy, sodu wodorotlenek (do dostosowania pH), acesulfam potasowy, sodu chlorek, sorbitol ciekły (niekrystalizujący) (E 420), karbomer, sodu cytrynian, aromat bananowy, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku:

- jeśli pacjent jest uczulony na którykolwiek ze składników Espumisan 100 mg/ml.

Ostrzeżenia

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Espumisan 100 mg/ml należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

- Lek ten można stosować przez 6 miesięcy po pierwszym otwarciu opakowania.
- W przypadku pojawienia się nowych dolegliwości konieczna jest wizyta u lekarza. Nie należy przyjmować tego leku dłużej niż 14 dni bez konsultacji z lekarzem. Jeśli dolegliwości nie ustąpiły w tym czasie, należy zwrócić się do lekarza.
- Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Producent

INPHARM/BERLIN-CHEMIE