

Espumisan 100 mg/ ml, krople doustne, emulsja, 30 ml



Cena: 32,82 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	ESPUMISAN
Opakowanie	30 ml (but.)
Postać	Krople
Producent	BERLIN CHEMIE AG
Przeznaczenie	Eliminacja gazów, Łagodzące (kojące)
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla niemowlaka, Dla seniorów, Od 1 miesiąca życia

Opis produktu

Opis

Espumisan 100 mg/ml to lek w formie mlecznobiałej emulsji do stosowania doustnego, przeznaczony do leczenia objawów wzdęć u niemowląt, dzieci, młodzieży i dorosłych.

Krople Espumisan są również stosowane w celu zmniejszenia nadmiernego gromadzenia się gazów w okresie okołoperacyjnym oraz wspomagająco przed badaniami jamy brzusznej.

Wskazania

Lek Espumisan 100 mg stosuje się u niemowląt, dzieci, młodzieży, dorosłych:

- w leczeniu objawowym zaburzeń żołądkowo-jelitowych związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów np. wzdęć, wzdęć w okresie pooperacyjnym,
- pomocniczo w badaniach diagnostycznych jamy brzusznej – radiologicznych, USG, endoskopowych – w celu redukcji ceni wywołanych gazami.

Działanie

Łagodzenie wzdęć poprzez zmniejszanie napięcia powierzchniowego pęcherzyków gazu, co powoduje ich pękanie. Uwolnione gazy są lepiej wchłaniane przez ścianę jelita lub usuwane z przewodu pokarmowego dzięki ruchom perystaltycznym jelit.

Dawkowanie

- niemowląt: 5-10 kropli dodanych do mleka lub podanych na małej łyżeczce przed każdym karmieniem piersią,
- dzieci 1-6 lat: 10 kropli 3-5 razy na dobę,
- dzieci 6-14 lat: 10-20 kropli 3-5 razy na dobę,
- młodzieży i dorosłych: 20 kropli 3-5 razy na dobę.



Skład

1 ml emulsji zawiera:

- substancję czynną: symetykon 100 mg,
- substancje pomocnicze: makroglu stearynian, glicerolu monostearynian 40-55, kwas sorbinowy (E 200), sodu wodorotlenek (E 524) (do korekty pH), sodu chlorek, karbomery, sodu cytrynian (E331), sukraloza (E955), woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Nie stosować leku Espumisan 100 mg/ml w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną - symetykon lub na którąkolwiek z pozostałych substancji pomocniczych leku.

Ostrzeżenia

- Lek zawiera sorbitol. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem produktu leczniczego.
- W przypadku pojawienia się nowych dolegliwości konieczna jest wizyta u lekarza.
- Nie należy przyjmować tego leku dłużej niż 14 dni bez konsultacji z lekarzem. Jeśli dolegliwości nie ustąpiły w tym czasie, należy zwrócić się do lekarza.
- Po pierwszym otwarciu opakowania Espumisan 100 mg/ml zachowuje trwałość przez 6 miesięcy.

Producent

BERLIN CHEMIE AG
Cybernetyki 7 B
Warszawa