

Espumisan 40 mg, 25 kapsułek

Cena: 8,17 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	ESPUMISAN
Opakowanie	25 kapsułek
Postać	Kapsułka
Producent	BERLIN-CHEMIE AG
Przeznaczenie	Eliminacja gazów, Łagodzące (kojące), Normalizujące
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 6 lat

Opis produktu

Opis

Espumisan to lek w formie niewielkich kapsułek, które są łatwe do połknięcia. Zawiera symetykon jako substancję czynną, stosowany w przypadku dolegliwości żołądkowo-jelitowych oraz wspomagająco podczas badań diagnostycznych. Symetykon powoduje pękanie pęcherzyków gazu w masie pokarmowej i śluzie przewodu pokarmowego, co umożliwia ich wchłanianie przez ścianę jelita i eliminację poprzez ruchy perystaltyczne. Symetykon nie wchłania się z przewodu pokarmowego i jest wydalany w niezmienionej postaci.

Wskazania

Espumisan jest lekiem do stosowania na wzdęcia oraz gazy, który może być stosowany w leczeniu objawowym zaburzeń trawiennych. Lek ten stanowi także środek pomocniczy do przygotowywania pacjentów do różnego rodzaju badań jamy brzusznej (badanie USG, gastroscopia, badanie radiologiczne). Espumisan może być stosowany również po przebytych zabiegach chirurgicznych jamy brzusznej.

Działanie

Substancja czynna leku - symetykon powoduje pękanie pęcherzyków gazu zawartych w masie pokarmowej i w śluzie przewodu pokarmowego, dzięki czemu gazy mogą być wchłaniane przez ścianę jelita lub usuwane z przewodu pokarmowego w wyniku ruchów perystaltycznych jelit.

Dawkowanie

Dzieci powyżej 6 lat, młodzież i dorośli: 2 kapsułki (co odpowiada 80 mg symetykonu) 3 do 4 razy na dobę.

Skład

1 kapsułka zawiera:

- substancję czynną: symetykon 40 mg;
- pozostałe składniki: metylu parahydroksybenzoesan, żelatyna, glicerol 85%, żółcień pomarańczowa FCF (E 110), żółcień



chinolinowa (E 104).

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Espumisan:

- w przypadku uczulenia na symetykon,
- w przypadku uczulenia na żółcień pomarańczową, parahydroksybenzoesan metylu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Ostrzeżenia

- W przypadku pojawienia się nowych i (lub) utrzymujących się dolegliwości brzusznych, należy poradzić się lekarza w celu ustalenia przyczyny dolegliwości i zdiagnozowania możliwej choroby wymagającej leczenia.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Producent

BERLIN CHEMIE AG
Cybernetyki 7 B
Warszawa