

Espumisan, (40 mg / ml), krople doustne, emulsja, 30 ml



Cena: 25,19 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	30 ml (but.)
Postać	Krople
Producent	INPHARM SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Wiatropędne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla niemowlaka, Dla seniorów, Od 1 miesiąca życia

Opis produktu

Opis

Espumisan zawiera symetykon, substancję czynną wykorzystywaną w leczeniu zaburzeń przewodu pokarmowego. Symetykon redukuje pienienie treści jelitowej i jest również stosowany jako pomoc w badaniach diagnostycznych.

Wskazania

Espumisan stosuje się:

- W leczeniu objawowym zaburzeń żołądkowo-jelitowych związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów, takich jak. np.: wzdęcia, niemowlęca kolka jelitowa u niemowląt powyżej 1 miesiąca życia
- Wspomagająco w przygotowaniu do badań łamy brzusznej, takich jak np. badanie radiologiczne i ultrasonograficzne oraz gastroskopia.
- Jako środek zmniejszający pienienie w zatruciach środkami powierzchniowo czynnymi (detergentami).

Działanie

Substancja czynna leku, symetykon, powoduje pękanie pęcherzyków gazu, zawartych w masach pokarmowych i w śluzie przewodu pokarmowego. Dzięki temu gazy, uwolnione na tej drodze, mogą być wchłaniane przez ścianę jelita lub usuwane z przewodu pokarmowego w wyniku ruchów perystaltycznych jelit.

Dawkowanie

Niemowlęta powyżej 1 miesiąca życia

- 1 - 2 ml (25 - 50 kropli), co odpowiada 40 - 80 mg symetykonu, na dobę w 2 (2 razy na dobę po 13 - 25 kropli) do 4 (4 razy na dobę po 6 - 13 kropli) dawkach podzielonych; całkowita dawka dobową nie większa niż 80 mg; lek Espumisan należy dodać do butelki z mlekiem lub podać na łyżeczce przed lub po karmieniu piersią.

Dzieci od 1 do 6 lat



- 1 ml (25 kropli), co odpowiada 40 mg symetykonu, 3 do 5 razy na dobę.

Dzieci od 6 do 14 lat

- 1 - 2 ml (25 - 50 kropli), co odpowiada 40 - 80 mg symetykonu, 3 do 5 razy na dobę.

Młodzież i dorośli

- 2 ml (50 kropli), co odpowiada 80 mg symetykonu, 3 do 5 razy na dobę.

Skład

Substancją czynną leku jest symetykon.

Substancje pomocnicze: makrogolu stearynian, glicerolu monostearnian 40-55, sodu wodorotlenek, sodu chlorek, karbomer, sodu cytynian, sukraloza, kwas sorbowy, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Nie stosować leku Espumisan jeśli pacjent ma uczulenie na symetykon lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Ostrzeżenia

- Lek Espumisan zawiera sorbitol - jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.
- Po pierwszym otwarciu opakowania lek zachowuje trwałość przez okres 6 miesięcy.
- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

BERLIN CHEMIE AG
Cybernetyki 7 B
Warszawa