

Espumisan 40mg/ml krople - 30 ml INPHARM



Cena: 23,81 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	30 ml
Postać	Krople
Producent	INPHARM SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Wiatropędne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla niemowlaka, Dla seniorów, Od 1 miesiąca życia

Opis produktu

Opis

Espumisan 40 mg/ml w kroplach zawiera symetykon, który pomaga w zaburzeniach przewodu pokarmowego poprzez zmniejszenie pienienia się treści jelitowej oraz jest stosowany pomocniczo podczas badań diagnostycznych. Może być używany przez osoby w każdym wieku. Symetykon działa poprzez powodowanie pęknięcia pęcherzyków gazu w masach pokarmowych i śluzie, co umożliwia ich wchłanianie przez ścianę jelita lub usuwanie z przewodu pokarmowego dzięki ruchom perystaltycznym jelit.

Wskazania

Espumisan stosuje się w leczeniu objawowym zaburzeń żołądkowo-jelitowych związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów w przewodzie pokarmowym, takich jak np.: wzdęcia i kolka niemowlęca. Wspomagająco w niemowlęcych kolkach jelitowych u niemowląt powyżej 1 miesiąca. Wspomagająco w przygotowaniu pacjentów do badań radiologicznych i ultrasonograficznych jamy brzusznej oraz gastrokopii. Jako środek zmniejszający pienienie treści przewodu pokarmowego w zatruciach środkami powierzchniowo-czynnymi (detergentami).

Skład

Substancja czynna: symetykon. Substancje pomocnicze: hydroksypropyloceluloza, kwas sorbowy, cyklaminian sodu, sacharyna sodowa, aromat bananowy, woda oczyszczona.

Sposób użycia

- Niemowlęta powyżej 1 miesiąca życia: 1ml - 2 ml (20 - 40 kropeł), co odpowiada 40-80mg symetykonu, na dobę w 2 (2 razy na dobę po 10-20 kropeł) do 4 (4 razy na dobę po 5-10 kropeł) dawkach podzielonych, całkowita dawka dobową nie większą niż 80mg, lek Espumisan należy dodać do butelki z mlekiem lub podać na łyżeczce przed lub po karmieniu piersią.
- Dzieci od 1 do 6 lat: 1ml (20 kropeł), co odpowiada 40mg symetykonu, 3 do 5 razy na dobę.
- Dzieci od 6 do 14 lat: 1ml - 2ml (20 - 40 kropeł), co odpowiada 40-80mg symetykonu, 3 do 5 razy na dobę.
- Młodzież i dorośli: 2ml (40 kropeł), co odpowiada 40mg symetykonu, 3 do 5 razy na dobę.



Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadku alergii (nadwrażliwości) na substancję czynną- symetykon lub na którąkolwiek z pozostałych substancji pomocniczych leku Espumisan.

Właściwości

- Substancją czynną leku Espumisan jest symetykon- stabilny, powierzchniowo czynny polidimetylosiloksan. Zmniejsza on napięcie powierzchniowe pęcherzyków gazu, zawartych w masach pokarmowych i w śluzie przewodu pokarmowego, powodując ich pękanie. Dzięki temu gazy, uwolnione na tej drodze mogą być wchłaniane przez ścianę jelita lub usuwane z przewodu pokarmowego w wyniku ruchów perystaltycznych jelit.
- Symetykon wykazuje wyłącznie działanie powierzchniowe i nie wchodzi w jakiegokolwiek reakcje chemiczne. Jest substancją farmakologicznie obojętną.
- Symetykon nie wchłania się z przewodu pokarmowego po podaniu doustnym i jest wydalany w postaci niezmienionej.

Producent

INPHARM/BERLIN-CHEMIE