

Etodal 100 mg/ g, żel, 100 g



Cena: 45,00 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	ZIAJA
Opakowanie	100 g (tub.)
Postać	Żel
Producent	ZIAJA LTD. Z.P.L. SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwzapalne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Etodal to żel leczniczy przeznaczony dla osób dorosłych, zawierający substancję czynną etofenamat. Etofenamat należy do kategorii niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Gdy jest stosowany miejscowo, wchłania się przez skórę i kumuluje się w obszarach dotkniętych stanem zapalnym.

Wskazania

Lek Etodal stosuje się u osób dorosłych:

- w przypadku tępych urazów, takich jak: stłuczenia, skręcenia, naciągnięcia mięśni, ścięgien i stawów;
- w chorobie zwyrodnieniowej stawów kręgosłupa, kolanowych, barkowych;
- w reumatyzmie pozastawowym takim jak: bóle okolicy krzyżowo-lędźwiowej, zmiany chorobowe w obrębie tkanek miękkich okołostawowych, tj. zapalenie

kaletki maziowej, ścięgien, pochewek ścięgnistych, torebek stawowych (tzw. staw zamrożony), zapalenia nadkłykci.

Działanie

Przeciwzapalne, przeciwbólowe.

Dawkowanie

Żel nakłada się w postaci paska długości około 5 - 10 cm na bolące miejsce. Żel wciera się w bolące miejsce do momentu wchłonięcia. Czynność powtarza się 3 do 4 razy na dobę. Leczenie dolegliwości reumatycznych trwa zazwyczaj 3 do 4 tygodni, zaś tępych urazów (np. urazów sportowych) - do 2 tygodni.

Skład

1 g żelu zawiera:



- substancję czynną: etofenamat 100 mg,
- substancje pomocnicze: glikol propylenowy, makrogol 400, makrogolu eter oleinocetylowy, sodu wodorotlenek, karbomer 980, alkohol izopropylowy, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu oraz jeśli pacjentka jest w trzecim trymestrze ciąży.

Działania niepożądane

- Niezbyt często: rumień, pieczenie skóry.
- Bardzo rzadko : zapalenie skóry (silny świąd, wysypka, obrzęk, wysypka pęcherzowa).
- Częstość nieznana: reakcja fotouczuleniowa. Wymienione powyżej działania niepożądane zazwyczaj ustępują szybko po odstawieniu leku.

Ostrzeżenia

- Nie należy stosować leku Etodal w przypadku uszkodzeń skóry lub wypryskowych zmian zapalnych na skórze oraz na błony śluzowe lub oczy.
- Podczas leczenia oraz w okresie dwóch tygodni po leczeniu należy unikać ekspozycji leczonych miejsc na słońce lub solarium.
- Pacjenci chorzy na astmę, przewlekłą obturacyjną chorobę dróg oddechowych, katar sienny lub przewlekły obrzęk błony śluzowej nosa (tzw. polipy nosa) lub przewlekłą infekcję dróg oddechowych, szczególnie w połączeniu z objawami podobnymi do kataru siennego, mogą stosować Etodal tylko pod warunkiem przestrzegania pewnych środków ostrożności i wyłącznie pod ścisłym nadzorem lekarza.

Producent

ZIAJA
Jesienna 9
Gdańsk