

Etopiryna, tabletki, 50 tabletek



Cena: 21,83 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	ETOPIRYNA
Opakowanie	50 tabletek
Postać	Tabletki
Producent	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwgorączkowe, Przeciwzapalne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 16 lat

Opis produktu

Opis

Etopiryna to lek stosowany w łagodzeniu bólów głowy oraz bólów o umiarkowanym nasileniu, szczególnie tych o podłożu zapalnym.

Wskazania

Etopirynę stosuje się w:

- bólach głowy,
- inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego.

Działanie

Etopiryna łączy w sobie działanie salicylanów (kwasu acetylosalicylowego i etenzamidu) oraz kofeiny. Dwa pierwsze składniki wywierają działanie przeciwbólowe, głównie w bólach spowodowanych stanem zapalnym. Kofeina nasila działanie przeciwbólowe salicylanów.

Dawkowanie

Zwykle stosowana dawka Etopiryny dla dorosłych i dzieci powyżej 16 roku życia to od 1 do 2 tabletek jednorazowo.

Skład

- Substancjami czynnymi są kwas acetylosalicylowy (Acidum acetylsalicylicum), etenzamid (Ethenzamidum), kofeina (Coffeinum).
- 1 tabletkę zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny.
- Substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana i laktoza jednowodna.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Etopiryna:

- uczulenie na kwas acetylosalicylowy lub którykolwiek ze składników leku,
- uczulenie na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne,
- jeśli u pacjenta występuje astma oskrzelowa, przewlekłe schorzenia układu oddechowego, gorączka sienna,
- jeśli u pacjenta występuje czynna choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy,
- jeśli u pacjenta występuje czynna niewydolność nerek, wątroby lub serca,
- jeśli u pacjenta występują zaburzenia krzepliwości krwi,
- jeśli u pacjenta występuje niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej.

Działania niepożądane

Po zastosowaniu leku mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

- Zaburzenia żołądka i jelit: niestrawność, zgaga, uczucie pełności w nadbrzuszu, nudności, wymioty, brak łaknienia, bóle brzucha, krwawienie z przewodu pokarmowego, uszkodzenie błony śluzowej żołądka, uczynnienie choroby wrzodowej,
- zaburzenia wątroby i dróg żółciowych np. tkliwość i powiększenie wątroby, przemijające zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy krwi, fosfatazy oraz stężenia bilirubiny;
- zaburzenia układu nerwowego: szumy uszne, zaburzenia słuchu, zawroty głowy,
- zaburzenia nerek i dróg moczowych,
- zaburzenia serca,
- nadciśnienie,
- zaburzenia krwi i układu chłonnego np. małopłytkowość, leukopenia, agranulocytoza, eozynopenia, zwiększone ryzyko krwawień, wydłużenie czasu

krwawienia i wydłużenie czasu protrombinowego

- zaburzenia układu immunologicznego np. wysypka, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli.

Ostrzeżenia

- Przyjmowanie w najmniejszej skutecznej dawce przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych.
- Produkt należy odstawić na 5 do 7 dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym, ze względu na ryzyko wydłużonego czasu krwawienia zarówno w czasie jak i po zabiegu.
- Należy ostrożnie stosować w przypadku: krwotoków macicznych, nadmiernego krwawienia miesiączkowego, stosowania wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej, nadciśnienia tętniczego oraz niewydolności serca.
- U pacjentów z młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniem stawów i (lub) toczeniem rumieniowatym układowym oraz niewydolnością wątroby produkt należy stosować ostrożnie, gdyż zwiększa się toksyczność salicylanów.
- U pacjentów w podeszłym wieku produkt należy stosować w mniejszych dawkach i w większych odstępach czasowych, ze względu na zwiększone ryzyko występowania objawów niepożądanych w tej grupie pacjentów.
- Produkt zawiera laktozę jednowodną.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Producent

POLPHARMA OTC
Pełplińska 19
Starogard Gdański

Galeria

