

Excilor Leczenie grzybicy paznokci, sztyft, 3,3 ml

Cena: 45,19 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	EXCILOR
Opakowanie	1 sztuka
Postać	sztyft
Producent	MAGNAPHARM POLAND SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwwgrzybicze
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Excilor sztyft to wyrób medyczny przeznaczony do leczenia grzybicy paznokci. Po aplikacji natychmiast penetruje płytkę paznokcia, obniżając pH i tworząc niekorzystne środowisko dla grzybów, co hamuje rozwój infekcji. Efekty są widoczne w ciągu dwóch tygodni, gdy zaczyna odrastać zdrowy paznokieć. Preparat zawiera glicerol, lipidy i biotynę, które zmiękczej, nawilżają i odżywiają płytkę paznokcia podczas leczenia.

Sztyft z precyzyjnym aplikatorem ułatwia stosowanie i nie wymaga pilnowania paznokcia. Jedno opakowanie wystarcza na około 400 aplikacji.

Składniki

Mleczan etylu, kwas octowy, środek poprawiający penetrację, substancja powłokotwórcza, woda, glicerol, polisorbát 80, octan cetylu, acetylowane alkohole lanolinowe, biotyna i środek konserwujący.

Zastosowanie

Preparat przeznaczony do leczenia grzybicy paznokci.

Sposób użycia

- Stosuj Excilor 2 razy dziennie, rano i wieczorem.
- Przed użyciem dokładnie oczyść paznokieć (jeśli jest pokryty lakierem, należy go zmyć).
- Za pomocą aplikatora nałóż obficie preparat na całą powierzchnię paznokcia, a także na jego brzegi od spodu.
- Nie przyciskaj mocno aplikatora podczas nakładania preparatu.
- Przed założeniem skarpetek lub obuwia odczekaj 1-2 minuty, aby preparat zdążył wyschnąć i wnikać w paznokieć.
- Po nałożeniu preparatu Excilor odczuwalne może być mrowienie pod paznokciem.
- Dla uzyskania najlepszych rezultatów stosuj codziennie przez co najmniej 3 miesiące i kontynuuj do czasu odrośnięcia zdrowego paznokcia.



Przeciwwskazania

- Nie stosuj sztyftu Excilor w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu.
- Osoby chore na cukrzycę, u których występują problemy ze stopami, powinny skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu Excilor.
- Brak danych klinicznych dotyczących stosowania preparatu Excilor u dzieci oraz kobiet w kresie ciąży i karmienia piersią.

Ostrzeżenia

- Sztyft Excilor jest przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego.
- Unikaj kontaktu z oczami i błonami śluzowymi. W przypadku kontaktu z oczami lub błonami śluzowymi spłucz obficie wodą.
- Excilor może powodować działania niepożądane (bardzo rzadko, 1 przypadek na 100 000): uczucie pieczenia, świąd, łagodny miejscowy ból. Jeśli objawy będą się utrzymywać lub nasilać, przerwij stosowanie preparatu i skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
- Nie stosuj po upływie terminu ważności.

Producent

OYSTERSHELL