

Faringan, 5 mg + 1,5 mg, tabletki do ssania, 20 tabletek

Cena: 12,84 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	20 tabletek
Postać	Tabletki do ssania
Producent	SOLINEA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwbakteryjne, Znieczulające
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Faringan to lek dostępny w formie tabletek do ssania, przeznaczony do stosowania w przypadku bakteryjnych infekcji błony śluzowej gardła i jamy ustnej. Produkt ma miętowy smak, który zapewnia uczucie świeżości podczas stosowania.

Wskazania

Lek Faringan jest stosowany w leczeniu miejscowym stanów zapalnych błony śluzowej jamy ustnej (zapalenie jamy ustnej, zapalenie dziąseł, afty) oraz gardła (zapalenie gardła).

Działanie

Chloroheksydyna wykazuje działanie przeciwbakteryjne. Benzokaina działa miejscowo znieczulająco.

Dawkowanie

Zalecana dawka dla dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat: Ssać po jednej tabletki kilka razy na dobę. Jeśli jest taka potrzeba, ssać jedną tabletkę co 1-2 godziny, nie przekraczając 8 tabletek na dobę.

Skład

- Substancją czynną leku jest chloroheksydyna i benzokaina.
- Każda tabletki do ssania zawiera 5 mg chloroheksydyny dichlorowodoru (Chlorhexidini dihydrochloridum) i 1,5 mg benzokainy (Benzocainum).
- Substancje pomocnicze: izomalt (E 953), makrogol 6000, aromat miętowy (mentol, menton, olejek mięty pieprzowej, maltodekstryna, skrobi oktenyloburszynian sodu (E 1450)), aspartam (E 951), agnezu stearynian.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku w przypadku: nadwrażliwości na substancje czynne lub którykolwiek ze składników preparatu; pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy; ran i owrzodzeń jamy ustnej i gardła; małego stężenie cholinesterazy w osoczu; dzieci w wieku poniżej 12 lat; methemoglobinemii.

Działania niepożądane

- Rzadkie (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1 000 osób): reakcje alergiczne, miejscowe podrażnienie.
- Bardzo rzadkie (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 000 osób): reakcje nadwrażliwości, wstrząs anafilaktyczny.
- Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): methemoglobinemia (choroba krwi związana z powstaniem nieprawidłowej hemoglobiny), przebarwienie zębów, przebarwienie języka, pieczenie języka, mrowienie języka i (lub) zaburzenia smaku podczas długotrwałego (ponad tydzień) stosowania.

Ostrzeżenia

- Należy zachować ostrożność, jeśli pacjent: ma nietolerancję estrowych środków miejscowo znieczulających (zwłaszcza pochodnych kwasu para-aminobenzoowego (PABA)), parabenów lub p-fenylenodiaminy; zmiany nadżerkowe lub złuszczenie w obrębie błony śluzowej jamy ustnej.
- Chloroheksydyna zwiększa odkładanie kamienia nazębnego, dlatego podczas stosowania leku zaleca się szczególną dbałość o higienę jamy ustnej i rozważenie stosowania pasty do zębów, zapobiegającej odkładaniu kamienia.
- Podczas długotrwałego stosowania (dłużej niż 7 dni) leku mogą wystąpić odwracalne przebarwienia zębów oraz powierzchni języka.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

Solinea Sp. z o.o. Sp. K.
Elizówka 65, Hala I
21-003 Ciecierzyn