

Felogel Neo, 10 mg/ g, żel, 60 g

Cena: 11,09 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	60 g (tub.)
Postać	Żel
Producent	SOPHARMA WARSZAWA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwozrękowe, Przeciwzapalne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 14 lat

Opis produktu

Opis

Felogel Neo to leczniczy żel o właściwościach przeciwbólowych i przeciwzapalnych. Jego substancja czynna, diklofenak sodowy, należy do grupy leków przeciwreumatycznych oraz niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Wskazania

Lek Felogel Neo przeznaczony jest do stosowania w przypadku:

- miejscowego leczenia objawowego pourazowego stanu zapalnego ścięgien, mięśni stawów (np. powstałych wskutek nadwyrężeń, stłuczeń lub skręceń),
- ograniczonych stanów zapalnych tkanek miękkich (np. zapalenie ścięgien, czy łokieć tenisisty),
- ograniczonych i łagodnych zapaleń stawów.

Działanie

Przeciwbólowe, przeciwzapalne.

Dawkowanie

Stosowanie u dorosłych i młodzieży powyżej 14 roku życia:

- żel należy stosować miejscowo na skórę 2 do 3 razy na dobę i dokładnie rozsmarować aż do wchłonięcia przez skórę. Wymagana ilość żelu zależy od wielkości zmienionego obszaru.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku:

- lek należy stosować w zwykłej zalecanej dawce. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Skład



1 g żelu zawiera:

- 10 mg diklofenaku sodowego.
- Pozostałe składniki leku to: karbomer 980, makrogol 400, glikol propylenowy, dietanoloamina, sodu benzoesan, alkohol izopropylowy, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku Felogel Neo:

- jeśli pacjent ma uczulenie na diklofenak sodowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, astmę przebiegającą pod postacią napadu, pokrzywkę lub alergiczny nieżyt nosa.

Działania niepożądane

- Często: zaczerwienienie, świąd, wysypka, łuszczenie się skóry i suchość skóry.
- Bardzo rzadko: nadwrażliwość na światło - wysypka grudkowa.
- Częstość nieznana: uczucie pieczenia w miejscu podania

Ostrzeżenia

Należy zachować ostrożność jeśli: pacjent ma wrzód żołądka lub dwunastnicy; niewydolność krążenia (chorobę serca, która może prowadzić do łatwego męczenia się, duszności, obrzęki wokół kostek, itp.); pacjent ma problemy z nerkami; u pacjenta występowała nadwrażliwość na pokarmy i leki; pacjent choruje na astmę lub inne choroby uczuleniowe; u pacjenta występowała nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy lub inne leki przeciwreumatyczne.

Felogel Neo należy stosować tylko na nieuszkodzoną powierzchnię skóry. Należy unikać kontaktu żelu z oczami i błonami śluzowymi, nie połykać. W przypadku wystąpienia wysypki należy zaprzestać stosowania. Nie należy stosować z opatrunkami przepuszczającymi powietrze.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

SOPHARMA PLC
Iliensko Shosse 16
Sofia, Bułgaria