

# Feminella Vagi C, tabletki dopochwowe, 6 tabletek

Cena: 30,27 zł



## Opis słownikowy

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Dla kogo        | Dla kobiet                       |
| Opakowanie      | 6 tabletek                       |
| Postać          | Tabletki dopochwowe              |
| Producent       | MEDAGRO INTERNATIONAL SP. Z O.O. |
| Przeznaczenie   | Przeciwzapalne                   |
| Rodzaj produktu | Wyrób medyczny                   |
| Wiek            | Dla dorosłych, Dla seniorów      |

## Opis produktu

### Opis

**Feminella Vagi C** to wyrób medyczny w formie tabletek dopochwowych, stworzony z myślą o wspieraniu naturalnej równowagi mikroflory pochwy poprzez stabilizację lub odbudowę fizjologicznego pH. Po zastosowaniu preparatu środowisko pochwy szybko ulega zmianie, co skutecznie ogranicza rozwój bakterii beztlenowych odpowiedzialnych za bakteryjne zapalenie pochwy. Produkt może być bezpiecznie stosowany również przez kobiety w ciąży, a jedno opakowanie wystarcza na pełny cykl terapii.

### Wskazania

Tabletki Feminella Vagi C są stosowane pomocniczo w przypadku zapobiegania i leczenia bakteryjnego zapalenia pochwy. Tabletki są szczególnie przydatne u pacjentek z nawrotami choroby lub po zakończeniu terapii antybiotykowej.

### Działanie

Tabletki dopochwowe skutecznie zakwaszają środowisko pochwy, prowadząc do powrotu fizjologicznego pH, eliminują przykry zapach, są dobrze tolerowane nawet podczas dłuższego czasu stosowania.

### Skład

1 tabletkę zawiera: witaminę C 250 mg, żywicę silikonową, laktozę jednowodną, hydroksypropylometylocelulozę, magnezu stearynian.

### Sposób użycia

- Wprowadzić głęboko do pochwy jedną tabletkę, najlepiej wieczorem przed snem.
- Zaleca się stosować tabletki co najmniej przez 6 dni. W razie potrzeby leczenie można przedłużyć lub powtórzyć.
- Jedno opakowanie wystarcza na 1 pełną kurację.

### Ostrzeżenia

- Nie stosować w przypadku uczulenia lub nadwrażliwości na którykolwiek ze składników wyrobu.
- Nie stosować w przypadku infekcji lub podejrzenia infekcji pochwy wywołanej przez drożdże, ponieważ zakwaszenie pH pochwy może sprzyjać ich namnażaniu.



- Nie stosować przełamanych tabletek, aby uniknąć przypadkowych urazów podczas aplikacji.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
- Nie połykać.
- Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

#### Uwagi

- Wyrób medyczny może zawierać śladowe ilości białek mleka krowiego.
- Witamina C może zakłócać oznaczanie cukru w moczu, dehydrogenazy mleczanowej, transaminaz i bilirubiny.
- Witamina C zmniejsza działanie środków przeciwkrzepliwych.

#### Producent

POLICHEM S.A.  
Via Angelo Maspoli, 11  
6850 Mendrisio