

Fenistil 1 mg/ ml, krople doustne, 20 ml



Cena: 19,23 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	20 ml
Postać	Płyn
Producent	DELFARMA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwalergiczne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 6 lat

Opis produktu

Opis

Fenistil krople to lek, który blokuje działanie histaminy, substancji wywołującej reakcje alergiczne. Zawiera dimetyndenu maleinian jako substancję czynną.

Wskazania

Leczenie objawów chorób alergicznych skóry:

- pokrzywka,
- świąd w przebiegu atopowego zapalenia skóry,
- alergiczny wyprysk kontaktowy,
- wyprysk endogeny.

Leczenie objawów chorób alergicznych układu oddechowego:

- katar sienny,
- uczulenie na kurz domowy,
- sierść zwierząt, pierze.

Działanie

Przeciwalergiczne, przeciwhistaminowe.

Dawkowanie

- Dorośli i dzieci powyżej 12. roku życia: zaleca się stosowanie po 20 do 40 kropli 3 razy na dobę.
- Dzieci poniżej 12. roku życia: 6 kropli 3 razy dziennie w przypadku 8. miesięcznego niemowlęcia ważącego 9 kg,

Skład



1 ml kropli zawiera:

- substancja czynna: dimetyndenu maleinianu 1 mg,
- substancje pomocnicze: glikol propylenowy, kwas benzoesowy, disodu edetynian, disodu fosforan, dwunastowodny, kwas cytrynowy jednowodny, sacharyna sodowa, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

- Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na dimetyndenu maleinian lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
- U noworodków do ukończenia pierwszego miesiąca życia, zwłaszcza przedwcześnie urodzonych.

Działania niepożądane

Bardzo rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 osoby na 10 000 osób):

- trudności w oddychaniu lub przełykaniu,
- obrzęk twarzy, ust, języka lub gardła,
- zmęczenie,
- silny świąd skóry z czerwoną wysypką lub powiększającymi się pęcherzami, skurcze mięśni.

Rzadko (mogą występować u mniej niż 1 osoby na 1000 osób stosujących lek):

- pobudzenie,
- bóle głowy,
- zawroty głowy,
- dolegliwości żołądkowo-jelitowe,
- nudności,
- suchość w jamie ustnej,
- suchość w gardle.

Często (występują u mniej niż 1 osoby na 10 stosujących lek):

- senność,
- nerwowość.

Ostrzeżenia

- Pacjenci w podeszłym wieku powinni skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku, ponieważ są bardziej narażeni na działania niepożądane tego leku, takie jak pobudzenie i zmęczenie.
- Leku nie należy stosować u pacjentów w podeszłym wieku z dezorientacją.

Producent

DELFARMA