

Ferivag, kapsułki dopochwowe, 14 kapsułek

Cena: 65,56 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet
Opakowanie	14 kapsułek
Postać	Kapsułki
Producent	SOLINEA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Infekcje intymne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Ferivag to kapsułki dopochwowe wspomagające leczenie i profilaktykę infekcji pochwy (bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych), zapalenia pochwy, stanów zapalnych szyjki macicy oraz czasowego zaburzenia równowagi mikroflory pochwy. Zawiera liposomalną apolaktoferynę, która wykazuje wyższą aktywność niż laktoferyna dzięki łatwiejszemu wiązaniu jonów Fe³⁺. Technologia mikroenkapsulacji w liposomach zwiększa biodostępność i chroni glikoproteinę przed denaturacją. Apolaktoferyna działa przeciwdrobnoustrojowo i przeciwgrzybiczo poprzez wiązanie wolnego żelaza, które jest niezbędne dla wzrostu drobnoustrojów. Jej działanie przeciwwirusowe wynika ze zdolności wiązania się do glikozaminoglikanów błony komórkowej, co chroni przed wnikaniem wirusów i hamuje rozwój infekcji.

Działanie

- Wspomagająco w leczeniu i profilaktyce infekcji pochwy takich jak bakteryjne, wirusowe i grzybicze (kandydoza), zapalenie pochwy, stanów zapalnych szyjki macicy.
- We wszystkich przypadkach czasowego zaburzenia równowagi mikroflory pochwy.

Składniki

Skrobia ryżowa, apolaktoferyna, żelatyna roślinna, dwutlenek krzemu.

Stosowanie

Zaleca się stosowanie 1 kapsułki 1-2 razy na dzień, wprowadzając ją głęboko do pochwy w pozycji leżącej. Zaleca się stosowanie przez 7 dni. Przed użyciem wyrobu należy umyć ręce.

Przeciwwskazania

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu. Laktoferyna jest białkiem pozyskiwanym z mleka krowiego, stąd nie zaleca się stosowania w przypadku alergii na białka mleka.
- Nie stosować, jeśli opakowanie jest uszkodzone.



- Nie używać produktu po upływie terminu ważności. Termin ważności odnosi się do nienaruszonego i prawidłowo przechowywanego produktu.

Ostrzeżenia

- Przechowywać produkt zamknięty, w temperaturze nieprzekraczającej 25°C, w suchym miejscu, z dala od źródeł światła i ciepła.
- Produkt przeznaczony do stosowania dopochwowego. Produkt nie jest przeznaczony do użytku pediatrycznego.
- Wyrób należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- U kobiet w ciąży zaleca się konsultację z lekarzem przed zastosowaniem. Jednoczesne stosowanie innych produktów dopochwowych może uniemożliwić skuteczność i bezpieczeństwo wyrobu Ferivag.
- Nie połykać.
- Kiedy kapsułka się rozpuści, może spowodować bladoróżowe zabarwienie wydzieliny pochwowej, co wynika z naturalnego koloru apolaktoferyny.
- Wszelkie działania niepożądane, które nie zostały opisane w tej ulotce, należy zgłaszać lekarzowi lub farmaceucie.

Producent

SOLINEA