

# Fervex, 8 saszetek

Cena: 20,61 zł



## Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	FERVEX
Opakowanie	8 saszetek
Postać	granulki
Producent	UPSA SAS
Przeznaczenie	Ból, Gorączka, Grypa
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Od 15 lat

## Opis produktu

### Opis

Fervex 12 to lek stosowany do doraźnego leczenia objawów przeziębienia, grypy oraz stanów grypopodobnych u dzieci powyżej 15 roku życia, oraz dorosłych.

### Wskazania

Doraźne leczenie objawów grypy, przeziębienia i stanów grypopodobnych (ból głowy, gorączka, zapalenie błony śluzowej nosa i gardła) u dorosłych i dzieci powyżej 15 lat.

### Działanie

Przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, zmniejszające przekrwienie i obrzęk błon śluzowych.

### Dawkowanie

Dorośli i dzieci powyżej 15 lat: 1 saszетка 2 lub 3 razy na dobę.

### Skład

1 saszетка zawiera:

- paracetamol 500 mg, kwas askorbowy 200 mg, maleinian feniraminy 25 mg, substancje pomocnicze: sacharoza (11,5 g), bezwodny kwas cytrynowy, guma akacjowa, sacharyna sodowa, naturalny aromat cytrynowo-rumowy.

### Przeciwwskazania

- Nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.
- Ciężkiej niewydolności wątroby lub nerek.
- Jaskry z wąskim kątem przesączania.
- Rozrostu gruczołu krokowego z towarzyszącą retencją moczu.

- Wiek poniżej 15 lat.
- Nietolerancji niektórych cukrów

#### Działania niepożądane

Fervex może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego pacjenta wystąpią. Poniżej przedstawiam możliwe działania niepożądane:

Ostry atak jaskry, który może objawiać się wysokim ciśnieniem w oku, bólem oka i zamgleniem widzenia (ryzyko większe u pacjentów ze skłonnością do jaskry).

- Zaburzenia oddawania moczu.
- Uczucie suchości w ustach, zaburzenia widzenia, kołatanie serca, zaparcia.
- Zaburzenia równowagi, pamięci lub koncentracji uwagi, zawroty głowy (częściej u osób w podeszłym wieku).
- Zaburzenia koordynacji ruchowej, drżenia.
- Splątanie, omamy.
- Niepokój ruchowy, nerwowość, bezsenność.
- Uspokojenie lub senność, szczególnie na początku leczenia.

#### Interakcje

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich aktualnie stosowanych lekach, w tym również o lekach bez recepty. Należy być ostrożnym przy jednoczesnym stosowaniu Fervexu z następującymi lekami:

- Pochodne morfiny,
- Neuroleptyki,
- Barbiturany,
- Benzodiazepiny,
- Leki przeciwłękowe inne niż benzodiazepiny,
- Leki nasenne,

#### Ostrzeżenia

- Bez zalecenia lekarza nie stosować dłużej niż 5 dni.
- Leku nie należy łączyć z innymi lekami zawierającymi paracetamol. U osób dorosłych (o masie ciała powyżej 50 kg) dawka dobową paracetamolu nie powinna przekraczać 4 gram.
- Zwiększone ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u osób regularnie spożywających alkohol.
- Łączne stosowanie alkoholu i środków uspokajających może nasilać działanie leków przeciwhistaminowych, stąd należy unikać ich przyjmowania.
- Każda saszetka jest źródłem sacharozy (11,5 g), osoby chore na cukrzyce powinny wziąć pod uwagę zawartość cukru w saszetce.

#### Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.