

Fervex D, 8 saszetek



Cena: 23,53 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla diabetyków, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	FERVEX
Opakowanie	8 saszetek
Postać	granulki
Producent	UPSA SAS
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwgorączkowe
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 15 lat

Opis produktu

Opis

Fervex D to lek przeznaczony do krótkotrwałego leczenia objawów przeziębienia i grypy. Jest dostępny w postaci granulatu do przygotowania roztworu doustnego, zawierającego trzy składniki aktywne. Pierwszym z nich jest paracetamol, który działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. Drugim składnikiem jest feniramina, redukująca obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa, co ułatwia oddychanie. Trzecim składnikiem jest witamina C, która uzupełnia ewentualne niedobory. Lek Fervex D jest odpowiedni do stosowania u osób z cukrzycą.

Wskazania

Doraźne leczenie objawów grypy, przeziębienia i stanów grypopodobnych (ból głowy, gorączka, zapalenie błony śluzowej nosa i gardła) u dorosłych i dzieci powyżej 15 lat; może być stosowany przez chorych na cukrzycę.

Działanie

Paracetamol działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo; maleinian feniraminy zmniejsza przekrwienie i obrzęk błon śluzowych, przez co udrażnia przewody nosowe, hamuje odruch kichania i łzawienia oczu. Kwas askorbowy uzupełnia niedobory witaminy C w organizmie.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 15 lat; 1 saszетка 2 lub 3 razy na dobę.

Skład

1 saszетка zawiera: paracetamol 500mg, kwas askorbowy 200mg, maleinian feniraminy 25mg oraz substancje pomocnicze: mannitol, bezwodny kwas cytrynowy, poliwidon, magnezu cytrynian bezwodny, aspartam, naturalny aromat antylski (875748).

Przeciwwskazania

Nie stosować leku Fervex D u osób z nadwrażliwością na substancje czynne lub którąkolwiek z substancji pomocniczych. Przeciwwskazaniami do zastosowania leku są: ciężka niewydolność wątroby lub nerek, jaskra z wąskim kątem, rozrost gruczołu

krokowego z utrudnionym oddawaniem moczu, fenyloketonuria.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, Fervex D może powodować wystąpienie działań niepożądanych:

- Działania neurovegetatywne: Uspokojenie lub senność, bardziej nasilone w początkowej fazie leczenia, objawy antycholinergiczne, takie jak suchość błon śluzowych, zaparcia, zaburzenia akomodacji, rozszerzenie źrenic, kołatanie serca, ryzyko zatrzymania moczu, nadciśnienie ortostatyczne, zaburzenia równowagi, zawroty głowy, zaburzenia pamięci lub koncentracji uwagi, częściej u osób w wieku podeszłym; zaburzenia koordynacji ruchowej, drżenia, omamy,
- Reakcje nadwrażliwości: rumień, świąd, wyprysk, plamica, pokrzywka, obrzęk, wstrząs anafilaktyczny,
- Objawy ze strony układu krwiotwórczego: leukocytopenia, neutropenia, małopłytkowość, niedokrwistość hemolityczna

Ostrzeżenia

- Lek zawiera paracetamol, więc należy zwrócić uwagę na zawartość tej substancji czynnej w innych produktach, aby zapobiec przedawkowaniu.
- Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u pacjentów głodzonych i regularnie pijących alkohol.
- Paracetamol należy stosować ostrożnie u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej (G-6-PD).
- Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Producent

UPSA SAS
3, rue Joseph Monier
92500 Rueil-Malmaison, Francja