

Fervex ExtraTabs, 500 mg + 4 mg, tabletki powlekane, 16 tabletek

Cena: 56,76 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	16 tabletek
Postać	tabletki powlekane
Producent	UPSA SAS
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwgorączkowe, Udrażniające nos
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Fervex ExtraTabs to wieloskładnikowy lek przeznaczony do łagodzenia typowych objawów przeziębienia i grypy, takich jak podwyższona temperatura, bóle głowy, wodnisty katar, kichanie czy łzawienie oczu. Zawiera dwie substancje czynne, które współdziałają, skutecznie redukując uciążliwe symptomy infekcji.

Wskazania

Produkt leczniczy Fervex ExtraTabs wskazany jest do leczenia objawowego dolegliwości grypy i przeziębienia u osób w wieku 15 lat i starszych.

Działanie

Fervex ExtraTabs zawiera 2 substancje czynne, gdzie każda z nich wywiera następujące działanie:

- paracetamol - zmniejsza gorączkę i ból, działa przeciwgorączkowo,
- chlorofenamina - zmniejsza katar (nieżyt błony śluzowej nosa), łzawienie oczu i kichanie.

Dawkowanie

Młodzież powyżej 15 lat, osoby dorosłe: 1 tabletka, nie częściej niż co 4 godziny. Nie należy przekraczać 4 tabletek na dobę (2000 mg paracetamolu i 16 mg chlorofenaminy).

Skład

- Substancjami czynnymi leku są: paracetamol (Paracetamolum) i chlorofenamina (Chlorphenamini maleas).
- 1 tabletka zawiera 500 mg paracetamolu i 4 mg maleinianu chlorofenaminy.
- Substancje pomocnicze: kroscarmeloza sodowa, hypromeloza, celuloza mikrokryształiczna, powidon K 90, glicerolu dibehenian,

magnezu stearynian,

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Fervex ExtraTabs:

- jeśli występuje uczulenia (nadwrażliwość) na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- u dzieci i młodzieży poniżej 15 lat,
- jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką chorobę wątroby, występują problemy z oddawaniem moczu (z powodu prostaty i innej przyczyny),
- jeśli istnieje ryzyko wystąpienia jaskry.

Działania niepożądane

Skutkami ubocznymi związanymi z paracetamolem mogą być:

- wysypki skórne, zaczerwienienie skóry, reakcja alergiczna, ciężkie reakcje skórne,
- krwawienia z nosa, krwawienia z dziąseł,
- dolegliwości przewodu pokarmowego: biegunka, ból brzucha,
- zaburzenia krzepnięcia, zwiększona aktywność enzymów wątrobowych.

Działania niepożądane związane z chlorofenaminą:

- senność - szczególnie na początku leczenia, zaburzenia czujności,
- spadek ciśnienia krwi,
- suchość w jamie ustnej, zaburzenia widzenia, zatrzymanie moczu, zaparcia, kołatanie serca,
- drżenie, zaburzenia koordynacji ruchowej.

Ostrzeżenia

- Lek zawiera paracetamol i chlorofenaminę - należy wziąć to pod uwagę stosując inne leki, które również mogą być źródłem tych substancji.
- Jeśli podczas stosowania tego leku wystąpi ropna wydzielina z nosa, gorączka i/lub ból będzie się utrzymywać, należy skonsultować się z lekarzem.
- Niektóre schorzenia mogą stanowić ograniczenie co do stosowania tego leku, są to m.in.: niewydolność nerek, choroba alkoholowa wątroby, anoreksja, bulimia, odwodnienie.
- W składzie tego leku występuje azorubina (barwnik azowy, E 122), który może być przyczyną reakcji alergicznej.
- Stosowanie tego leku w niektórych grupach pacjentów powinno odbywać się z zachowaniem ostrożności - szczególnie u osób w podeszłym wieku lub u pacjentów ze skłonnością do zaparć, zawrotów głowy, senności, czy pacjentów z zaburzeniami prostaty.

Producent

UPSA SAS
3, rue Joseph Monier
92500 Rueil-Malmaison, Francja