

Fervex, granulat do sporządzania roztworu doustnego, smak cytrynowy, 8 saszetek

Cena: 24,65 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	8 saszetek
Postać	granulki
Producent	INPHARM SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwgorączkowe, Udrażniające nos
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 15 lat

Opis produktu

Opis

Fervex to lek przeznaczony do łagodzenia objawów przeziębienia i grypy. Zawiera trzy aktywne składniki, które działają na różnych poziomach. Paracetamol, który łagodzi ból i obniża gorączkę, jest jednym z nich. Feniramina, kolejny składnik, zmniejsza obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa, ułatwiając oddychanie. Dodatkowo, witamina C w preparacie pomaga uzupełnić jej niedobory. Fervex jest odpowiedni zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci powyżej 15. roku życia.

Wskazania

Wskazaniem do zastosowania leku Fervex jest doraźne leczenie objawów grypy, przeziębienia i stanów grypopodobnych, takich jak: ból głowy, gorączka, zapalenie błony śluzowej nosa i gardła. Lek jest przeznaczony dla dorosłych i dzieci powyżej 15 lat.

Działanie

Fervex posiada 3 substancje czynne. Paracetamol działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. Maleinian feniraminy powoduje zmniejszenie przekrwienia i obrzęku błon śluzowych, dzięki czemu udrażnia przewody nosowe, a w konsekwencji hamuje odruch kichania i łzawienie oczu. Kwas askorbowy uzupełnia niedobory witaminy C w organizmie.

Dawkowanie

Zwykle stosowane dawkowanie u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 15 lat to 1 saszетка 2 lub 3 razy na dobę, ale z co najmniej 4-godziną przerwą.

Składniki

Substancjami czynnymi leku są: paracetamol, kwas askorbowy, maleinian feniraminy.

Substancje pomocnicze: sacharoza, bezwodny kwas cytrynowy, guma akacjowa, sacharyna sodowa, naturalny aromat cytrynowo-rumowy.

Przeciwwskazania

Nie stosować leku Fervex u osób z nadwrażliwością (uczuleniem) na substancje czynne lub którąkolwiek z substancji pomocniczych. Przeciwwskazaniami do zastosowania leku są: ciężka niewydolność wątroby lub nerek, jaskra z wąskim kątem, rozrost gruczołu krokowego z utrudnionym oddawaniem moczu. Nie podawać osobom z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy, galaktozy lub niedoborem sacharazy, izomaltazy, ze względu na zawartość sacharozy w leku.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

- Działania neurowegetatywne: uspokojenie lub senność, bardziej nasilone w początkowej fazie leczenia, objawy antycholinergiczne, takie jak suchość błon śluzowych, zaparcia, zaburzenia akomodacji, rozszerzenie źrenic, kołatanie serca, ryzyko zatrzymania moczu, nadciśnienie ortostatyczne, zaburzenia równowagi, zawroty głowy, zaburzenia pamięci lub koncentracji uwagi, częściej u osób w wieku podeszłym; zaburzenia koordynacji ruchowej, drżenia, omamy.
- Reakcje nadwrażliwości: rumień, świąd, wyprysk, plamica, pokrzywka, obrzęk, wstrząs anafilaktyczny.
- Objawy ze strony układu krwiotwórczego: leukocytopenia, neutropenia, małopłytkowość, niedokrwistość hemolityczna.

Ostrzeżenia

- Lek do krótkotrwałego stosowania, tzn. bez konsultacji z lekarzem nie stosować dłużej niż 5 dni.
- Lek zawiera paracetamol, więc należy zwrócić uwagę, czy w innych przyjmowanych produktach również on nie występuje, aby uniknąć ryzyka przedawkowania. W przypadku pacjentów niedożywionych, głodzonych, regularnie spożywających alkohol występuje większe ryzyko uszkodzenia wątroby. Paracetamol należy stosować ostrożnie u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej (G-6-PD).
- W przypadku chorych na cukrzycę należy uwzględnić obecność w leku cukru, którego zawartość wynosi 11,5 g w jednej saaszetce.
- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Producent

UPSA SAS
3, rue Joseph Monier
92500 Rueil-Malmaison, Francja