

## Fervex malina x 8 saszetek



Cena: 21,37 zł

### Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	FERVEX
Opakowanie	8 saszetek
Postać	granulki
Producent	UPSA SAS
Przeznaczenie	Ból, Gorączka, Grypa
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Od 15 lat

### Opis produktu

#### Opis

Fervex malinowy jest lekiem stosowanym do doraźnego leczenia objawów przeziębienia, grypy oraz stanów grypopodobnych u dzieci powyżej 15 roku życia oraz dorosłych. Jest to preparat leczniczy złożony, który zawiera trzy substancje czynne:

- Paracetamol: Ma działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe, pomaga w łagodzeniu bólu mięśniowego, gardła, głowy oraz obniża gorączkę.
- Maleinian feniraminy: Pomaga zmniejszyć obrzęk i przekrwienie błon śluzowych nosa, co może przynieść ulgę w przypadku kataru.
- Kwas askorbowy (witamina C): Uzupełnia niedobór witaminy C w organizmie, która może być zwiększona w czasie przeziębienia i grypy.

#### Wskazania

Doraźne leczenie objawów grypy, przeziębienia i stanów grypopodobnych (ból głowy, gorączka, zapalenie błony śluzowej nosa i gardła) u dorosłych i dzieci powyżej 15 lat

#### Działanie

Przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, zmniejszające przekrwienie i obrzęk błon śluzowych.

#### Dawkowanie

Dorośli i dzieci powyżej 15 lat: 1 saszетка 2 lub 3 razy na dobę, z zachowaniem minimalnych 4-godzinnych przerw.

#### Skład

1 saszетка zawiera:

- substancje czynne: paracetamol 500 mg, kwas askorbowy 200 mg, maleinian feniraminy 25 mg;
- substancje pomocnicze: sacharoza (11,555g), kwas cytrynowy bezwodny, guma arabska, sacharyna sodowa i aromat malinowy.

## Przeciwwskazania

- Nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.
- Ciężkiej niewydolności wątroby lub nerek.
- Jaskry z wąskim kątem przesączania.
- Rozrostu gruczołu krokowego z towarzyszącą retencją moczu.
- Wiek poniżej 15 lat.
- Nietolerancji niektórych cukrów.

## Działania niepożądane

Fervex może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego pacjenta wystąpią. Poniżej przedstawiam możliwe działania niepożądane:

- Ostry atak jaskry, który może objawiać się wysokim ciśnieniem w oku, bólem oka i zamgleniem widzenia (ryzyko większe u pacjentów ze skłonnością do jaskry).
- Zaburzenia oddawania moczu.
- Uczucie suchości w ustach, zaburzenia widzenia, kołatanie serca, zaparcia.
- Zaburzenia równowagi, pamięci lub koncentracji uwagi, zawroty głowy (częściej u osób w podeszłym wieku).
- Zaburzenia koordynacji ruchowej, drżenia.
- Splątanie, omamy.
- Niepokój ruchowy, nerwowość, bezsenność.
- Uspokojenie lub senność, szczególnie na początku leczenia.

## Interakcje

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich aktualnie stosowanych lekach, w tym również o lekach bez recepty. Należy być ostrożnym przy jednoczesnym stosowaniu Fervexu z następującymi lekami:

- Pochodne morfiny,
- Neuroleptyki,
- Barbiturany,
- Benzodiazepiny,
- Leki przeciwłukowe inne niż benzodiazepiny,
- Leki nasenne,

## Ostrzeżenia

- Osoby w podeszłym wieku są bardziej narażone na wystąpienie zawrotów głowy, zaburzeń równowagi, zaburzeń pamięci, zaburzeń koncentracji uwagi.
- Stosując lek Fervex nie należy stosować innych leków zawierających paracetamol; osoby dorosłe o masie większej niż 50 kg nie powinny przyjmować więcej niż 4 gramy na dobę (4000 mg) paracetamolu.
- Zwiększone ryzyko uszkodzenia wątroby występuje u osób regularnie spożywających alkohol.
- Podczas przyjmowania leku Fervex nie należy spożywać alkoholu, leków zawierających alkohol oraz środków uspokajających.
- Lek zawiera sacharozę - należy wziąć to pod uwagę stosując dietę ubogocukrową i u osób z cukrzycą.

## Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.