

Figura1 3 g x 20 sasz.



Cena: 10,48 zł

Opis słownikowy

Część ciała	Jelita
Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	HERBAPOL
Opakowanie	20 saszetek
Postać	Saszetki
Producent	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Przeznaczenie	Zaparcia
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 12 lat

Opis produktu

Opis

Figura 1, fix to produkt leczniczy w postaci mieszanki ziołowej zawierający liść senesu do stosowania w zaparciach. Produkt do zaparzania w saszetkach.

Wskazania

Jako środek przeczyszczający do krótkotrwałego stosowania w zaparciach występujących sporadycznie.

Działanie

Przeczyszczające.

Dawkowanie

Maksymalna dzienna dawka glikozydów hydroksyantracenowych wynosi 30 mg. Jest to dawka równoważna 1 saszetce produktu leczniczego Figura 1. Właściwą dawką indywidualną jest najniższa dawka niezbędna do uzyskania miękkiego stolca. Młodzież powyżej 12. lat życia, dorośli i osoby starsze: 1 saszetkę zalać 1 szklaną gorącej wody (około 200 ml) i naparzać pod przykryciem przez około 10 minut. Przygotowany napar wypić wieczorem, po jedzeniu (od 2-3 do całości przygotowanego naparu). Działanie przeczyszczające następuje przeciętnie po 6-10 godzinach. Nie zaleca się stosowania preparatu dłużej niż 7-10 dni.

Skład

1 saszetka (3,0 g) zawiera 0,9 g liścia senesu, co odpowiada 16,2 mg - 30 mg glikozydów hydroksyantracenowych przeliczonych jako sennozyd B.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Figura 1, fix

- w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
- w niedrożności, zwężeniu lub atonii jelit, chorobach zapalnych okrężnicy, bólach brzucha o nieznannej przyczynie, zapaleniu wyrostka robaczkowego, ciężkim
- odwodnieniu z utratą elektrolitów.
- u dzieci poniżej 12 lat.
- u kobiet w ciąży i karmiących piersią

Działania niepożądane

świąd, pokrzywka, miejscowa lub uogólniona wysypka

Ostrzeżenia

- W przypadku codziennej potrzeby stosowania środków przeczyszczających należy zbadać przyczynę występowania zaparć i skonsultować się z lekarzem.
- Jeśli pobudzające środki przeczyszczające są stosowane dłużej niż przez krótki okres leczenia może to prowadzić do zaburzenia czynności jelit i uzależnienia od tych środków.
- Należy unikać długotrwałego stosowania środków przeczyszczających.
- Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 30oC.
- Chronić od światła, wilgoci i wpływu obcych zapachów.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Galeria

