

Fitolizyna, pasta, zawiesina doustna, 100 g

Cena: 29,87 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	FITOLIZYNA
Opakowanie	100 g
Postać	Pasta
Producent	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Przeznaczenie	Kamica dróg moczowych, Stan zapalny, Zapalenie, Zapalenie pęcherza moczowego
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Fitolizyna to lek w formie pasty doustnej, będący tradycyjnym preparatem roślinnym o działaniu moczopędnym i przeciwzapalnym.

Wskazania

Fitolizyna jest stosowana:

- pomocniczo w zakażeniach i stanach zapalnych dróg moczowych,
- pomocniczo w kamicy dróg moczowych (w drobnych złożach, tzw. piasku nerkowym),
- profilaktycznie w kamicy nerkowej.

Działanie

Składniki pasty Fitolizyna są stosowane tradycyjnie jako środki moczopędne i przeciwzapalne.

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w określonych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania.

Dawkowanie

Zwykle stosowana dawka pasty Fitolizyna przez dorosłych:

- 1 łyżeczkę (ok. 5g) pasty rozpuścić w połowie szklanki ciepłej przegotowanej wody.
- Pić 3-4 razy dziennie.
- Bez konsultacji z lekarzem nie stosować dłużej niż 2-4 tygodnie.

Skład

- Substancją czynną leku jest wyciąg złożony.
- Substancje pomocnicze: glicerol 99,5%, agar, olejek eteryczny miętowy, olejek eteryczny szalwii muskatołowej, olejek eteryczny pomarańczy słodkiej, olejek eteryczny sosny zwyczajnej, skrobia pszeniczna, wanilina, etylu parahydroksybenzoesan (E214), woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Fitolizyna:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub na rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae, dawniej Compositae), z rodziny baldaszkowatych (Apiaceae dawniej Umbelliferae), anetol lub na alergeny pyłku brzozy, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- w przypadkach, w których zaleca się zmniejszenie ilości płynów (np. ciężkie choroby serca lub nerek).

Działania niepożądane

Mogą wystąpić następujące działania niepożądane (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

- reakcje alergiczne (świąd, wysypka, pokrzywka, alergiczny nieżyt nosa);
- zawroty głowy;
- nudności, wymioty, biegunka, wzdęcia;
- nadwrażliwość na promienie UV.

Ostrzeżenia

- Jeśli objawy nasilą się, nie ustąpią lub towarzyszyć im będzie gorączka, ból i trudności w oddawaniu moczu lub obecność krwi w moczu, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
- Nie stosować przy obrzękach spowodowanych niewydolnością serca lub nerek.
- Ze względu na hipoglikemizujące działanie kozieradki, pacjenci chorzy na cukrzycę powinni monitorować poziom cukru we krwi.
- Lek zawiera etanol.
- Lek zawiera skrobię pszeniczną. Lek odpowiedni dla osób z chorobą trzewną (celiaką). Leku nie powinni stosować pacjenci z alergią na pszenicę (inną niż choroba trzewna)
- Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 25°C.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Producent

HERBAPOL WARSZAWA
Ołówkowa 54
Pruszków