

# Fix Red Slim Tea, 30 saszetek

Cena: 10,42 zł



## Opis słownikowy

Część ciała	Jelita
Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	30 torebek
Postać	Saszetki
Producent	ELANDA PHARMA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Zaparcia
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 12 lat

## Opis produktu

### Opis

**Red Senes Tea** to lek zawierający senes, który działa przeczyszczająco. Jest przeznaczony do stosowania okresowego w krótkotrwałym leczeniu zaparcí.

### Wskazania

Zaparcia nawykowe wywołane błędami żywnościowymi.

### Działanie

Środek przeczyszczający.

### Dawkowanie

Młodzież powyżej 12 lat i dorośli: 1 saszетка dziennie (1 napar). Lek można stosować 2-3 razy w tygodniu.

### Skład

1 saszетка 2g zawiera: substancje czynne: liść senesu 800mg o zawartości 17-23 miligramów glikozydów hydroksyantracenowych w przeliczeniu na sennozyd B / saszетка 2g.

### Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować Red Senes Tea:

- w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- u osób poniżej 12 lat,
- jeśli u pacjenta występują: zwężenie i niedrożność jelit, atonia jelit (zastój jelit), zapalenie wyrostka robaczkowego, stany zapalne okrężnicy (choroba Crohn'a, wrzodziejące zapalenie okrężnicy), ból brzucha niewiadomego pochodzenia, odwodnienie z towarzyszącą utratą elektrolitów.

### Działania niepożądane

- reakcje nadwrażliwości (pokrzywka, świąd, uogólniona wysypka),
- bóle i skurcze brzucha,
- płynne stolce (szczególnie w przypadku jelita nadwrażliwego lub być objawem przedawkowania / zbyt dużej dawki),
- zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej, w konsekwencji wzrasta ryzyko albuminurii i hematurii,

### Ostrzeżenia

- W przypadku ciężkich zaparć, stosowanie leku omówić z lekarzem.
- Leku nie powinno stosować się w przypadku bólu brzucha, nudności i wymiotach.
- Pacjenci przyjmujący np. glikozydy nasercowe, leki przeciwarrytmiczne, leki moczopędne powinni skonsultować z lekarzem stosowanie liści senesu.
- Lek należy stosować jedynie doraźnie i krótkotrwale (nie dłużej niż 1-2 tygodni).
- Długotrwałe stosowanie może wiązać się z zaburzeniem funkcji jelit oraz uzależnienia od środków przeczyszczających.

### Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.