

Flavamed 30 mg, 20 tabletek

Cena: 17,51 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	FLAVAMED
Opakowanie	20 tabletek (2x10)
Postać	Tabletka
Producent	BERLIN CHEMIE AG
Przeznaczenie	Kaszel, Mokry kaszel
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Flavamed to lek przeciwkaszlowy i przeciwprzeziębieniowy stosowany w leczeniu mokrego kaszlu, który jest towarzyszem chorób dolnych dróg oddechowych, takich jak ostry i przewlekły stan zapalny płuc i oskrzeli. Jego działanie polega na rozrzedzaniu i ułatwianiu wykrztuszania gęstej wydzieliny. Standardowa kuracja Flavamedem trwa zazwyczaj od 4 do 5 dni

Wskazania

Leczenie mukolityczne w ostrych i przewlekłych schorzeniach oskrzeli i płuc, przebiegających z zaburzeniami wytwarzania i transportu śluzu.

Działanie

Rozrzedzanie śluzu w celu ułatwienia odkrztuszenia.

Dawkowanie

- Dzieci w wieku 6 do 12 lat: ½ tabletki 2 do 3 razy na dobę (co odpowiada 15 mg ambroksolu chlorowodoru 2 – 3 razy na dobę). Maksymalna dawka dobową to 1½ tabletki (co odpowiada 45 mg ambroksolu chlorowodoru).
- Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: w czasie pierwszych 2 – 3 dni, 1 tabletkę 3 razy na dobę (co odpowiada 30 mg ambroksolu chlorowodoru 3 razy na dobę); następnie 1 tabletkę dwa razy na dobę (co odpowiada 30 mg ambroksolu chlorowodoru dwa razy na dobę). Maksymalna dawka dobową to 3 tabletki (co odpowiada 90 mg ambroksolu chlorowodoru).

Skład

1 tabletkę zawiera:

- substancję czynną: chlorowodorek ambroksolu 30 mg,
- substancje pomocnicze: laktozę jednowodną, skrobię kukurydzianą, celulozę (proszek), kroscarmelozę sodową, powidon K 30,

magnezu stearynian

Przeciwwskazania

Flavamed jest przeciwwskazany u osób z nadwrażliwością na substancję czynną (ambroksol) lub którąkolwiek substancję pomocniczą obecną w leku. Nie należy go stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Należy zachować ostrożność przy stosowaniu leku u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy, zaburzeniami czynności nerek i/lub ciężką niewydolnością wątroby. Pacjenci z astmą oskrzelową powinni stosować Flavamed ostrożnie, ponieważ lek może nasilać kaszel i powodować nadmierne odkrztuszanie. Istnieje również możliwość wystąpienia zastoju śluzu u pacjentów z zaburzoną motoryką oskrzelową.

Działania niepożądane

- nudności,
- wymioty, nudności, bóle brzucha,
- niestrawność,
- wysypka,
- pokrzywka,

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ostrzeżenia

- Lek Flavamed zawiera laktozę.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
- Przechowywać pojemnik wielodawkowy szczelnie zamknięty w celu ochrony przed światłem i wilgocią.
- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.