

Flavamed Max syrop 30mg/5ml 100ml



Cena: 17,51 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	FLAVAMED
Opakowanie	100 ml (but.)
Postać	Roztwór
Producent	BERLIN CHEMIE AG
Przeznaczenie	Kaszel mokry
Rodzaj produktu	Produkt leczniczy
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Od 2 lat

Opis produktu

Opis

Flavamed Max zawiera substancję czynną ambroksolu chlorowodorek. Wskazany jest do stosowania u dzieci w wieku od 2 lat, młodzieży i dorosłych.

Wskazania

Leczenie mukolityczne w ostrych i przewlekłych schorzeniach oskrzeli i płuc, przebiegających z zaburzeniami wytwarzania i transportu śluzu.

Działanie

Sekretolityczne i mukolityczne (działa wykrztuśnie, rozrzedzając wydzielinę).

Dawkowanie

- dzieci w wieku 2-5. lat: 1/4 łyżki miarowej (1,25ml syropu) 3 razy na dobę;
- dzieci w wieku 6-12. lat: 1/2 łyżki miarowej (2,5ml syropu) 2-3 razy na dobę;
- młodzież w wieku powyżej 12. lat i dorośli: 1 łyżka miarowa (5ml syropu) 3 razy na dobę przez pierwsze 2-3 dni, następnie 1 łyżka miarowa (5ml syropu) 2 razy na dobę. U osób dorosłych, jeżeli to konieczne, dawkę można zwiększyć do 2 łyżek miarowych (każda po 5ml) syropu 2 razy na dobę.

Skład

5ml syropu zawiera substancję czynną: 30mg chlorowodoru ambroksolu oraz substancje pomocnicze: sorbitol ciekły, niekryształujący (E 420), kwas benzoesanowy (E 210), glicerol 85%, hydroksyetyloceluloza, aromat malinowy, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania



- Lek Flavamed nie powinien być stosowany u pacjentów, którzy są nadwrażliwi na substancję czynną (ambroksol) lub którąkolwiek substancję pomocniczą obecną w leku.
- W przypadku ciąży i karmienia piersią, stosowanie Flavamedu jest możliwe tylko w przypadku wyraźnego zalecenia lekarza. Należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku w tych okolicznościach.
- Ostrożność powinna być zachowana u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Należy skonsultować się z lekarzem przed podaniem leku dziecku w tej grupie wiekowej.
- Ostrożność powinna być zachowana u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy, zaburzeniami czynności nerek i/lub ciężką niewydolnością wątroby, astmą oskrzelową oraz z zaburzoną motoryką oskrzelową. Flavamed może nasilać kaszel i powodować nadmierne odkrztuszanie, co może być niekorzystne w tych stanach.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Producent

BERLIN CHEMIE AG
Cybernetyki 7 B
Warszawa