

Flavamed syrop 15mg/5ml 100 ml



Cena: 17,51 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	FLAWAMED
Opakowanie	100 ml
Postać	Syrop
Producent	BERLIN CHEMIE AG
Przeznaczenie	Kaszel, Kaszel mokry
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dziecka, Dla młodzieży, Od 1 roku życia

Opis produktu

Opis

Flavamed to syrop, który jest przepisywany dzieciom powyżej 1. roku życia oraz dorosłym w przypadku ostrych i przewlekłych chorób płuc i oskrzeli, które charakteryzują się problemami z wytwarzaniem i transportem śluzu.

Działanie leku Flavamed polega na rozrzedzeniu wydzieliny, co powoduje jej zmienienie się w bardziej płynną formę. Dzięki temu ułatwia się proces odkrztuszania śluzu, co może przynieść ulgę w przypadku problemów z oddychaniem, kaszlu i nadmiernym gromadzeniem się śluzu w drogach oddechowych.

Wskazania

Ostre i przewlekłe schorzenia oskrzeli i płuc, przebiegające z zaburzeniami wytwarzania i odkrztuszania śluzu.

Działanie

Wykrztuśne, rozrzedzające wydzielinę.

Dawkowanie

- Dzieci w wieku od 1. do 2. lat: 2,5 ml syropu (pół miarki) 2 razy na dobę.
- Dzieci w wieku od 2. do 5. lat: 2,5 ml (pół miarki) syropu) 3 razy na dobę;
- Dzieci w wieku od 6. do 12. lat: 5 ml (jedna miarka) syropu) 2-3 razy na dobę;
- Dzieci w wieku od 12. lat i dorośli: w pierwszych 2-3 dniach leczenia 10 ml (2 miarki) syropu 2-3 razy na dobę. Leczenie kontynuuje się podając po 10 ml (2 miarki) syropu 2 razy na dobę.
- U osób dorosłych, jeżeli to konieczne, dawkę można zwiększyć do 60 mg 2 razy na dobę.

Lek należy przyjmować doustnie, po posiłku, za pomocą dołączonej miarki. Nie należy stosować leku bezpośrednio przed snem. Bez konsultacji z lekarzem, leku nie należy stosować dłużej niż 4-5 dni.

Skład

5 ml syropu zawiera:

- substancję czynną: 15 mg chlorowodoru ambroksolu,
- substancje pomocnicze: sorbitol 70% niekryształizujący kwas benzoesowy, glicerol 85%, hydroksyetyloceluloza, aromat malinowy, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Uczulenie na chlorowodorek ambroksolu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Działania niepożądane

- wymioty, nudności, bóle brzucha,
- obrzęk twarzy,
- zaburzenia oddechowe,
- gorączka.
- wysypka,
- pokrzywka.

Interakcje

Przed rozpoczęciem stosowania leku Flavamed należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich aktualnie przyjmowanych lekach oraz o ostatnio stosowanych lekach. Ważne jest również powiadomienie o planowanych lekach, które pacjent zamierza przyjmować.

W trakcie przyjmowania leku Flavamed istotne jest unikanie stosowania jakichkolwiek leków przeciwkaszlowych, które hamują odruch kaszlowy. Odruch kaszlowy pełni istotną rolę w procesie odkrztuszenia rozrzedzonego śluzu i usuwania go z płuc. Zaburzenie tego odruchu przez stosowanie leków przeciwkaszlowych może utrudniać skuteczne oczyszczanie dróg oddechowych z wydzieliny.

Ostrzeżenia

- Lek Flavamed zawiera sorbitol.
- Sorbitol może mieć lekkie działanie przeczyszczające.
- Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki: 6 miesięcy.
- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.