

Flegamax, 50 mg/ml, roztwór doustny, 120 ml



Cena: 33,36 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	FLEGAMAX
Opakowanie	1 butelka po 120 ml
Postać	Syrop
Producent	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Przeznaczenie	Kaszel, Kaszel mokry
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Od 6 lat

Opis produktu

Opis

Flegamax to lek, który rozrzedza wydzielinę oskrzelową, co ułatwia jej usuwanie. Jest przeznaczony dla dzieci powyżej 6 roku życia i dorosłych.

Wskazania

Syrop Flegamax stosuje się przy objawowym leczeniu chorób układu oddechowego, które przebiegają z nadmiernym wytwarzaniem gęstej i lepkiej wydzieliny.

Działanie

Flegamax działa mukolitycznie, czyli rozrzedza wydzielinę oskrzelową, przez co jest łatwiej usuwana z górnych dróg oddechowych podczas kaszlu.

Dawkowanie

- Dzieci w wieku od 6 lat do 12 lat: 5 ml produktu 3 razy na dobę.

Zaleca się, aby dziecko popiło przyjętą dawkę produktu wodą.

- Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: Początkowo należy podawać 15 ml produktu trzy razy na dobę, a następnie po wystąpieniu działania mukolitycznego zmniejszyć dawkę do 10 ml produktu trzy razy na dobę.

Skład

- Substancją czynną jest karbocysteina (Carbocisteinum)

- 1 ml roztworu doustnego zawiera 50 mg karbocysteiny.
- Substancje pomocnicze: sacharyna sodowa, metylu parahydroksybenzoesan, aromat malinowy (skład: maltodekstryna (z kukurydzy), skrobia modyfikowana (E 1450), substancje smakowo-zapachowe identyczne z naturalnymi, preparat smakowo-zapachowy), czerwień koszenilowa (E 124), sodu wodorotlenek, karboksymetyloceluloza, woda oczyszczona, sodu wodorotlenek, 1N roztwór wodny (do ustalenia pH).

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Flegamax:

- jeśli pacjent ma nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,
- jeśli występuje czynna choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy,
- w stanie astmatycznym,
- u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Działania niepożądane

Nieznana częstotliwość:

- bóle głowy,
- bóle brzucha,
- skórne reakcje alergiczne

Ostrzeżenia

- Jeśli u pacjenta w przeszłości występowała choroba wrzodowa to przed zastosowaniem leku, należy skonsultować się z lekarzem.
- W przypadku wystąpienia obfitej ropnej wydzieliny i gorączki, a także w przypadku przewlekłej choroby oskrzeli lub płuc oraz u pacjentów ze zmniejszoną zdolnością do odkrztuszania konieczna jest wizyta u lekarza, który może zalecić inne leki.
- Leczenie pacjentów z astmą oskrzelową powinno przebiegać pod dokładną kontrolą lekarską ze względu na możliwość wystąpienia skurczu oskrzeli. W przypadku wystąpienia tego objawu, należy natychmiast przerwać podawanie leku.
- Produkt zawiera od 7,6 do 7,8 mg sodu w 1ml syropu oraz czerwień koszenilową (E124), która może powodować reakcje alergiczne.
- Produkt zawiera metylu parahydroksybenzoesan, który może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).
- Pacjentom ze zmniejszoną zdolnością do odkrztuszania nie należy podawać karbocysteiny, jeśli w trakcie leczenia nie będzie zapewniona fizykoterapia oddechowa.

Producent

Medana Pharma SA
Władysława Łokietka 10
98-200 Sieradz