

Flegamax, 50 mg/ml, roztwór doustny, 200 ml



Cena: 52,22 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 butelka po 200 ml
Postać	Roztwór
Producent	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Przeznaczenie	Mukolityczne, Wykrztuśne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 6 lat

Opis produktu

Opis

Flegamax to doustny roztwór mukolityczny zawierający karbocysteinę, która wspomaga usuwanie gęstej wydzieliny z dróg oddechowych. Lek przeznaczony jest dla dzieci powyżej 6 roku życia oraz dla dorosłych.

Wskazania

Syrop Flegamax stosuje się przy objawowym leczeniu chorób układu oddechowego, które przebiegają z nadmiernym wytwarzaniem gęstej i lepkiej wydzieliny.

Działanie

Flegamax działa mukolitycznie, czyli rozrzedza wydzielinę oskrzelową, przez co jest łatwiej usuwana z górnych dróg oddechowych podczas kaszlu.

Dawkowanie

- Dawkowanie Flegamazu dla dzieci w wieku od 6 lat do 12 lat to 5 ml produktu 3 razy na dobę.
- W przypadku osób dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat podaje się początkowo 15 ml produktu trzy razy na dobę, a następnie po wystąpieniu działania mukolitycznego zmniejszyć dawkę do 10 ml produktu trzy razy na dobę.

Skład

- Substancją czynną leku jest karbocysteina (Carbocisteinum).
- Substancje pomocnicze: sacharyna sodowa, metylu parahydroksybenzoesan, aromat malinowy (skład: maltodekstryna (z kukurydzy), skrobia modyfikowana (E 1450), substancje smakowo-zapachowe identyczne z naturalnymi, preparat smakowo-zapachowy), czerwień koszenilowa (E 124), sodu wodorotlenek, karboksymetyloceluloza, woda oczyszczona, sodu wodorotlenek, 1N roztwór wodny (do ustalenia pH).



Przeciwwskazania

- Nie stosować Flegamaxu u osób z nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
- Przeciwwskazaniem do zastosowania leku jest czynna choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, stan astmatyczny.

Działania niepożądane

Częstość nieznana: bóle głowy, bóle brzucha, skórne reakcje alergiczne.

Ostrzeżenia

- Jeśli u pacjenta w przeszłości występowała choroba wrzodowa to przed zastosowaniem leku, należy skonsultować się z lekarzem.
- W przypadku wystąpienia obfitej ropnej wydzieliny i gorączki, a także w przypadku przewlekłej choroby oskrzeli lub płuc oraz u pacjentów ze zmniejszoną zdolnością do odkrztuszania konieczna jest wizyta u lekarza, który może zalecić inne leki.
- Leczenie pacjentów z astmą oskrzelową powinno przebiegać pod dokładną kontrolą lekarską ze względu na możliwość wystąpienia skurczu oskrzeli. W przypadku wystąpienia tego objawu, należy natychmiast przerwać podawanie leku.
- Produkt zawiera od 7,6 do 7,8 mg sodu w 1ml syropu oraz czerwień koszenilową (E124), która może powodować reakcje alergiczne.
- Produkt zawiera metylu parahydroksybenzoesan, który może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).
- Pacjentom ze zmniejszoną zdolnością do odkrztuszania nie należy podawać karbocysteiny, jeśli w trakcie leczenia nie będzie zapewniona fizykoterapia oddechowa.

Producent

Medana Pharma SA
Władysława Łokietka 10
98-200 Sieradz